



ここからお切りください。

開封後はチャックを閉めて保管してください。

チャック

第2類医薬品

<強心薬> ワイズ製薬 強心薬 15錠

服用に際して、この説明文を必ずお読みください。

△使用上の注意

×してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください。 他の強心薬

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
消化器	吐き気・嘔吐

3. 5～6日間服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【効能・効果】

動悸、息切れ、気付け

【用法・用量】

次の量を、水又はぬるま湯で服用してください。

年齢	1回量	服用回数
成人(15歳以上)	1錠	1日1回
15歳未満	服用しないでください	

<用法・用量に関連する注意>

かまずに服用してください。

【成分・分量】

1日量(1錠) 中 センソ……2mg

添加物:乳糖水和物、結晶セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、クロスカルメロースナトリウム、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム、ステアリン酸マグネシウム、ヒプロメロース、酸化チタン、スクラロース、カルナウバロウ、三酸化鉄

【保管及び取扱い上の注意】

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所にチャックを閉めて保管してください。
2. 小児の手の届かない所に保管してください。
3. 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わるおそれがあります。)
4. 湿気等の影響により本剤が変質するおそれがありますので、服用後はそのつど必ずチャックをしっかり閉めてください。
5. ぬれた手で触れないでください。水分が錠剤につくと、表面が一部溶けて、変色又は色むらを生じることがあります。また、ぬれた錠剤を袋に戻すと他の錠剤にも影響を与えますので、戻さないでください。
6. 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

<製品に関するお問い合わせ>

ワイズ製薬株式会社 お客様相談室
電話 0120-922-353(フリーダイヤル)

副作用被害救済制度

電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

【販売元】 ワイズ製薬株式会社 神奈川県横浜市中区相生町6-113 オーク桜木町ビル10階

【製造販売元】 シオノケミカル株式会社 東京都中央区八重洲2-10-10

使用期限

製造番号



4 589799 780806



76671101-A