


# キャッチコシ<sup>®</sup>

## お問い合わせ先


製造販売元  **共立薬品工業株式会社**  
 奈良県高市郡高取町清水谷1085  
 お客さま相談室 ☎0744-52-4741  
 受付時間9:00~17:00(土・日・祝を除く)

本品は薬膏と保護用(固定)絆創膏および保護用パッドが一体となっていますので、ただ貼るだけで簡単にお使いいただけます。

## ■ 特 長

### ソフトな粘着パッド


外部からの刺激による痛みをやわらげます。




### 薬膏部分

体温により適度に薬膏が軟化し、常に患部に密着するため、サリチル酸の角質軟化作用を持続的に発揮します。


### 患部に浸透




## ■ 上手な使い方



- 1~2日に1度、10日間程度ご使用ください。入浴後に貼ると一層効果があります。患部がぬれている時は、よくふいてから使用してください。



- 貼りかえの際、白くなった角質部を清潔なピンセット等で痛みを感じない程度に取り除いてください。



- うおのめは、しんを完全に取り除かないと何度でも再発しますので、しんが取れるまで使用をくり返してください。

## 補助テープ付

\* 動きやすい患部やずれやすい足の裏・指などに使用する場合には、さらに固定用補助テープで十字にしっかりとめてください。



使用に際してはこの添付文書を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

## 05.05 ⚠ 使用上の注意

### ⊗ してはいけないこと

守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります

1. 次の部位には使用しないこと
  - (1) 目の周囲、粘膜、やわらかい皮ふ面(首のまわりなど)、顔面等。
  - (2) 炎症または傷のある患部。
2. 次の行為は絶対にしないこと
  - (1) 口に入れないこと。



### 相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談すること
  - (1) 乳幼児。
  - (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
  - (3) 薬によりアレルギーを起こしたことのある人。
  - (4) 妊娠又は妊娠していると思われる婦人。
  - (5) 糖尿病の治療を受けている人。
  - (6) 角質以外のやわらかいいぼや扁平いぼ。
2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この添付文書を持って医師又は薬剤師に相談すること
  - (1) 本品の使用後又は使用中、次の症状があらわれた場合。

関係部位	皮 膚
症 状	発疹・発赤、かゆみ

## 効 能

うおのめ・たこ・いぼ

## 用 法

中央の薬膏部を患部に貼付して移動しないように固定する。

## ⚠ 用法に関連する注意

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- (2) 本剤の使用後及び使用後は、患部を消毒するなどして清潔に保ってください。
- (3) 薬膏部が患部の周りの皮ふにつかないよう注意して使用してください。

## 成分・分量

本品100g(0.06 m<sup>2</sup>)中 日局サリチル酸……………10g  
 添加物として乳酸、ポリオキシエチレンラノリン、ラノリン、サラシミツロウを含有する。

## 内 容

12枚(補助テープ付)

## 保管及び取扱い上の注意

1. 小児の手の届かない所に保管してください。
2. 直射日光の当たらない、涼しい所に保管してください。
3. 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になります)
4. 本剤を貼付したまま入浴しないこと。(膏体が融けてなくなることがあります)
5. 本剤を貼った部位を暖房器具などで温めないでください。(膏体が融けることがあります)
6. はがす時は、皮ふを痛めないようゆっくりはがしてください。(皮ふ刺激の原因になります)