

鼻炎用内服薬 **コルゲン^{ユーワ}鼻炎持続カプセル**

花粉やハウスダストなどによるアレルギー性鼻炎や、鼻かぜなどの急性鼻炎によって引き起こされるくしゃみ、鼻水、鼻づまりなどの症状は、単につらく不快だけでなく、集中力を低下させたり、睡眠をさまたげたりして、日常生活に支障をきたしかねません。コルゲン^{ユーワ}鼻炎持続カプセルには、先に溶けて効き始める顆粒とゆっくり溶けて後から効く顆粒が配合されていますので、1日2回朝夕の服用でつらい鼻炎の諸症状にすぐれた効きめをあらわします。なお、本剤は7歳以上のお子様から服用できます。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

1. 次の人は服用しないこと

- (1) 本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2) 次の症状のある人。
前立腺肥大による排尿困難
- (3) 次の診断を受けた人。
高血圧、心臓病、甲状腺機能障害、糖尿病

2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないこと

他の鼻炎用内服薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬(かぜ薬、鎮咳去痰薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬)、塩酸フェニルプロパノールアミンを含有する内服薬(かぜ薬、鎮咳去痰薬)

3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないこと

(眠気や目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状があらわれることがある。)

4. 長期連用しないこと



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 高齢者。
- (4) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (5) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (6) 次の症状のある人。
高熱、排尿困難、むくみ
- (7) 次の診断を受けた人。
緑内障、腎臓病
- (8) モノアミン酸化酵素阻害剤(塩酸セレギリン等)で治療を受けている人。

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師又は薬剤師に相談すること

- (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい、不眠、神経過敏、頭痛
その他	排尿困難、顔のほてり、異常なまぶしさ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
ショック(アナフィラキシー)	服用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しき等があらわれる。
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこぼれる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。

(2)5~6日間服用しても症状がよくなる場合

- 3.次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談すること
口のかわき、便秘

効能・効果/急性鼻炎、アレルギー性鼻炎又は副鼻腔炎による次の諸症状の緩和：
くしゃみ、鼻水、鼻づまり、なみだ目、のどの痛み、頭が重い

用法・用量/下記の量を服用する。

年 齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	2カプセル	2回 朝夕
7歳以上15歳未満	1カプセル	
7歳未満の幼児	服用しないこと	

<用法・用量に関連する注意>

- (1)用法・用量を厳守すること。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。
- (3)カプセルの取り出し方：右図のようにカプセルの入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して、裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用すること。
(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながる。)



成分・分量(4カプセル中)

成分・分量	働 き
クロルフェニラミンマレイン酸塩 8.0mg	アレルギーなどによる、くしゃみ、鼻水といった症状を抑えます。
ベラドンナ総アルカロイド 0.4mg	鼻汁と涙液の分泌を抑制し、鼻水、なみだ目を改善します。
塩酸ブソイドエフェドリン 120.0mg	鼻粘膜の充血やハレを抑制し、鼻づまりを改善します。
グリチルリチン酸 45.0mg	鼻粘膜やのどの炎症を抑制し、鼻づまりやのどの痛みをしずめます。
無水カフェイン 100.0mg	鼻炎に伴う頭重をやわらげます。

[添加物]トウモロコシデンプン、乳糖、セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、カルメロースCa、エチルセルロース、グリセリン脂肪酸エステル、タルク、赤色102号、カラギーナン、ソルビタン脂肪酸エステル

保管及び取り扱い上の注意

- (1)高温をさげ、直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2)小児の手の届かない所に保管すること。
- (3)他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4)PTPのアルミ箔が破れたり、中身のカプセルが変形しないように、保管及び携帯に注意すること。
- (5)使用期限(外箱に記載)をすぎた製品は服用しないこと。

本製品に関するお問い合わせは
興和株式会社 医薬事業部 お客様相談センターへお願いします。
〒103-8433 東京都中央区日本橋本町三丁目4-14
TEL 03-3279-7755 FAX 03-3279-7566
電話受付時間:月~金(祝日を除く)9:00~17:00



Kowa 発売元 興和株式会社 東京都中央区日本橋本町三丁目4-14
製造販売元 大昭製薬株式会社 滋賀県甲賀市甲賀町大原市場168