

この説明書は、お薬とともに保管し、
使用の際には、よくお読みください。



目のかすみ・疲れに

第3類医薬品

サンテザイオン®V3

眼科薬

目を酷使すると、遠近のピントを合わせる機能(調節機能)が衰え、文字がかすんで見えにくくなるといった目の不快症状が現れます。

サンテザイオンV3は、神経の伝達を円滑にし、ピント調節機能を回復させるネオスチグミンメチル硫酸塩に加え、末梢血管の血流を改善して栄養補給を助ける天然型ビタミンEや組織代謝を活発にするビタミンB₆・パントテノールなどを配合し、目のかすみ・疲れに効果を発揮します。また、スッキリとした清涼感とともに7種類の有効成分が目には広がります。

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は使用前に医師または薬剤師にご相談ください。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 本人または家族がアレルギー体質の人
- (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (4) 次の症状のある人
はげしい目の痛み
- (5) 次の診断を受けた人
緑内障

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師または薬剤師にご相談ください。

(1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ

(2) 目のかすみ改善されない場合

(3) 2週間位使用しても症状がよくならない場合

用法・用量

1回2～3滴、1日5～6回点眼してください。

● 次の注意事項をお守りください。

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 容器の先をまぶた、まつ毛に触れさせないでください
(目やにや雑菌などの混入のため、薬液が汚染または混濁することがあります)。また、混濁したものは使用しないでください。
- (3) ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。
- (4) 点眼用にのみ使用してください。



裏面につづく

効能・効果

目のかすみ(目やにの多いときなど)、目の疲れ、結膜充血、目のかゆみ、眼瞼炎(まぶたのただれ)、紫外線その他の光線による眼炎(雪目など)、眼病予防(水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど)、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感


成分・分量

成 分	分 量	はたらき
天然型ビタミンE (酢酸d- α -トコフェロール)	0.05%	末梢血管の血液の流れを良くします。
ビタミンB ₆ (ピリドキシン塩酸塩)	0.05%	目の組織代謝を活発にします。
パンテノール	0.05%	目の組織代謝を活発にします。
ネオスチグミンメチル硫酸塩	0.005%	ピント調節機能改善作用により、目の疲れなどを改善します。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	0.01%	ヒスタミンの働きを抑え、目の炎症・目のかゆみを抑えます。
イブシロン-アミノカプロン酸	1.0%	炎症の原因となる物質の産生を抑えます。
タウリン	1.0%	目の組織代謝を活発にします。

添加物として、エデト酸ナトリウム水和物、クロロブタノール、ゲラニオール、ベンザルコニウム塩化物液、ホウ酸、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、ポリソルベート80、d-ボルネオール、l-メントール、等張化剤、pH調節剤を含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。製品の品質を保持するため、自動車の中や暖房器具の近くなど高温となる場所に放置しないでください。また、高温となる場所に放置したものは、容器が変形して薬液が漏れたり薬液の品質が劣化しているおそれがありますので、使用しないでください。



- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
(3)他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
(4)他の人と共用しないでください。
(5)使用期限をすぎた製品は使用しないでください。また、使用期限内であっても、開封後はできるだけ速やかに使用してください。
(6)保存の状態によっては、成分の結晶が容器の点眼口周囲やキャップの内側に白くつくことがあります。その場合には清潔なガーゼで軽くふき取って使用してください。

包 装 13mL

〔自然環境に配慮し、携帯袋は添付しておりません。ご理解の程お願い申し上げます。〕

お問い合わせ先

商品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願い申し上げます。

参天製薬株式会社「お客様相談室」 電話番号 06-6321-8950
受付時間 9:00~17:00(土・日・祝日を除く)