

目のかゆみ・充血に

第2類医薬品

サンテALクール[®]II

眼科薬

花粉によるアレルギー症状などをしずめるバランス処方

花粉・ハウスダストなどによる目のアレルギーは、かゆみや充血などの不快な症状を伴うだけでなく、炎症によって目の組織にもダメージを与えています。

サンテALクールIIは、抗ヒスタミン剤などがかゆみ・充血を効果的に抑えるだけでなく、炎症で傷ついた組織の修復を促す成分を配合した目薬です。さらに、スッキリとしたクールなさし心地で、目に爽快感を与えます。

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は使用前に医師または薬剤師にご相談ください。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 本人または家族がアレルギー体質の人
- (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (4) 次の症状のある人
はげしい目の痛み
- (5) 次の診断を受けた人
緑内障

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師または薬剤師にご相談ください。

- (1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ

- (2) 目のかすみ改善されない場合
- (3) 5～6日間使用しても症状がよくなる場合

用法・用量

1回2～3滴、1日5～6回点眼してください。

●次の注意事項をお守りください。

- (1) 過度に使用すると、異常なまぶしさを感じたり、かえって充血を招くことがあります。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 容器の先をまぶた、まつ毛に触れさせないでください
(目やにや雑菌などの混入のため、薬液が汚染または混濁することがあります)。また、混濁したものは使用しないでください。
- (4) ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。
- (5) 点眼用にのみ使用してください。



裏面につづく

効能・効果

目のかゆみ、結膜充血、眼瞼炎(まぶたのただれ)、眼病予防(水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど)、紫外線その他の光線による眼炎(雪目など)、目の疲れ、目のかすみ(目やにの多いときなど)、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感

成分・分量

成 分	分 量	はたらき
クロルフェニラミンマレイン酸塩 (抗ヒスタミン剤)	0.03%	アレルギー症状の原因となるヒスタミンの働きを抑え、目の炎症・かゆみを抑えます。
グリチルリチン酸二カリウム	0.25%	アレルギー原因物質の放出を抑え、炎症をしずめます。
イブシロン-アミノカブロン酸	1.0%	炎症の原因となる物質の産生を抑えます。
塩酸テトラヒドロゾリン	0.03%	血管を収縮させ、結膜(白目の部分)の充血を除去します。
タウリン	1.0%	細胞の代謝を活発にし、炎症で傷ついた目の組織修復を促します。
パンテノール	0.1%	


添加物として、エデト酸ナトリウム水和物、ベンザルコニウム塩化物液、d-カンフル、d-ボルネオール、l-メントール、等張化剤、pH調節剤を含有します。

〈成分・分量に関連する注意〉

本剤は点眼後、ときに口中に甘味を感じることがあります。これは成分のひとつであるグリチルリチン酸二カリウムが、涙道を通して口中に流れ出てくることによるもので、品質などの異常によるものではありません。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。製品の品質を保持するため、自動車の中や暖房器具の近くなど高温となる場所に放置しないでください。また、高温となる場所に放置したものは、容器が変形して薬液が漏れたり薬液の品質が劣化しているおそれがありますので、使用しないでください。



- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
(3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
(4) 他の人と共用しないでください。
(5) 使用期限をすぎた製品は使用しないでください。また、使用期限内であっても、開封後はできるだけ速やかに使用してください。
(6) 保存の状態によっては、成分の結晶が容器の点眼口周囲やキャップの内側に白くつくことがあります。その場合には清潔なガーゼで軽くふき取って使用してください。

包 装 15mL

〔自然環境に配慮し、携帯袋は添付しておりません。ご理解の程お願い申し上げます。〕

お問い合わせ先

商品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願い申し上げます。

参天製薬株式会社「お客様相談室」 電話番号 06-6321-8950
受付時間 9:00~17:00(土・日・祝日を除く)

製造販売元
参天製薬株式会社
大阪市東淀川区下新庄3-9-19
www.santen.co.jp

商品およびアイケアに関する情報は <http://hitomi-sukoyaka.com>