

この添付文書は、本剤の使用前に必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

目のつかれ・かゆみに

第3類医薬品

アイキュート®

目薬

イプシロン-アミノカプロン酸(EACA)配合

テレビ、パソコンなどを多用する仕事による目の疲れ、排気ガスや細菌、紫外線による炎症など、現代社会で目は常に厳しい環境にさらされています。

アイキュートは炎症が原因のかゆみやはれなどの症状を改善するイプシロン-アミノカプロン酸(EACA)、クロルフェニラミンマレイン酸塩、細菌の発育を抑えるペルベリン塩化物水和物に加え、眼精疲労を改善するネオスチグミンメチル硫酸塩、ビタミンB₆、タウリンなどを配合しております。

やさしいさしごちで、効果を発揮します。



使用上の注意



■ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (4) 次の症状のある人。はげしい目の痛み
- (5) 次の診断を受けた人。緑内障

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この添付文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。

- (1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ



- (2) 目のかすみが改善されない場合
- (3) 2週間位使用しても症状がよくならない場合

効 能

目の疲れ、結膜充血、眼病予防(水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど)、紫外線その他の光線による眼炎(雪目など)、眼瞼炎(まぶたのただれ)、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感、目のかゆみ、目のかすみ(目やにの多いときなど)

用法・用量

1日3～6回、1回1～3滴点眼してください。

<用法・用量に関連する注意>

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3)容器の先をまぶた、まつ毛に触れさせないでください。また、混濁したものは使用しないでください。
- (4)ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。
- (5)点眼用のみ使用してください。


成分(100mL中)

成 分	含 量	は た ら き
ネオスチグミンメチル硫酸塩	5 mg	目のピント調節機能を改善し、疲れ目を緩和します。
イブシロン・アミノカプロン酸 (EACA)	2000 mg	抗プラスミン作用で炎症を抑えます。
ベルベリン塩化物水和物	5 mg	消炎・殺菌作用で、局所の炎症をしずめると共に、二次感染の予防にも効果をあらわします。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	10 mg	抗ヒスタミン作用で目のかゆみなどの炎症を抑えます。
ピリドキシン塩酸塩 (ビタミンB ₆)	100 mg	目の新陳代謝を活発にし、疲れ目の改善を助けます。
酢酸d- α -トコフェロール (ビタミンE)	30 mg	末梢血管の流れをよくし、目の栄養補給を助けます。
タウリン	1000 mg	目の新陳代謝を活発にし、疲れ目の改善を助けます。

添加物：ホウ酸、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、エタノール、ベンザルコニウム塩化物、pH調整剤

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
(品質を保持するため車中・暖房器具の近くなど高温となる場所に保管しないでください。)
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)他の人と共用しないでください。
- (5)保存の状態によっては、容器の点眼口周囲やキャップの内側に成分の結晶が付くことがあります。このような場合には清潔なガーゼなどで軽くふき取って使用してください。
- (6)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。
- (7)本剤は黄色の点眼剤です。衣服に付着すると、着色することがありますので注意してください。
万一付着した場合、水で洗い落としてください。



販売元
サンドラッググループ

発売元
田辺三菱製薬株式会社
大阪市中央区道修町3-2-10

製造販売元
テイカ製薬株式会社
富山県富川一丁目3番27号

本品のお問い合わせは、お買い求めのお店、又は下記にお願いいたします。
田辺三菱製薬「くすり相談センター」
(フリーダイヤル ☎0120-54-7080)
受付時間：弊社営業日の9:00～17:30