

かゆみの元を 抑えます

ジフェンヒドラミン塩酸塩

効能・効果

かゆみ、虫さされ

用法・用量

1日数回、適量を患部に塗布してください

〈用法・用量に関する注意〉

- (1) 小児に使用する場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください
- (2) 目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください

- (3) 本剤は外用にのみ使用し、内服しないでください
- (4) 定められた用法・用量を守ってください

副作用被害救済制度の問い合わせ先
(独)医薬品医療機器総合機構
電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

製造
番号

使用
期限

第2類医薬品

非ステロイド

2つのかゆみ止め成分配合

虫さされ かゆみ



かゆみの伝達を
止めます
リドカイン

かゆみの元を 抑えます

ジフェンヒドラミン塩酸塩

クリピタ
ローション

50mL



かゆみの伝達を
止めます

リドカイン

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない温湿の少ない涼しい所に密栓して保管してください
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください
- (3) 他の容器に入れかえないでください(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)
- (4) 火気に近づけないでください
- (5) メガネ、時計、アクセサリーなどの金属類、化織の衣類、プラスチック類、床や家具などの塗装面等に付着すると変質することがありますので、付着しないよう注意してください
- (6) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください

※使用の際は薬液をスポンジに十分浸透させてから塗布してください

成分・分量 100mL中

ジフェンヒドラミン塩酸塩 2.0g
リドカイン 0.5g
d-メントール 3.0g
dL-カンフル 2.0g
添加物:クエン酸水和物、ヒドロキシプロピルセルロース、エタノール、アジピン酸ジイソプロピル、ハーアセチルショ糖、アンモニア

製造販売元

三友 薬品 株式会社
東京都足立区鹿浜1丁目9番14号

お客様相談室 03-3899-9333

ここから
開けてください

ご使用に際し、外箱に記載の説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

1 2つのかゆみ止め成分(ジフェンヒドラミン塩酸塩、リドカイン)のダブル効果

2 d-メントール配合でひんやりして爽快な塗りごこち

3 首曲がり容器なのでどんな部位でも塗りやすい

⚠️ 使用上の注意

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 食事などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (3) 湿潤やただれのひどい人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明文書をもって医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 ふ	発疹・赤色、かゆみ、はれ

3. 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明文書をもって医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

販売名 クリピタローション

第2類医薬品

