2008年6月作成

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

第②類医薬品

かゆみを科学する

鎮痒消炎剤

ダニ・ノミ・毛虫・ムカデ・クラゲなどによる
虫ささされ・かゆみをしっかり治療する

液体ムヒアルファ®EX

販売名：液体ムヒアルファEX

ムヒが創った効き目こだわりの虫ささされ・かゆみ止め薬＜液体タイプ＞

- **毒虫による被害が増えています**
  最近は、地球温暖化の影響やペットブーム、都市部の公園整備等により、私たちの身近にこれまでいなかったような毒虫に刺される機会が増えています。特にダニ、ノミ、毛虫、ムカデなどの毒虫やクラゲなどに刺されると従来の虫ささされ薬では対応しきれないほどの激しいかゆみや炎症を引き起こしがちです。
- **効き目にこだわった「PVA＋ジフェンヒドラミン塩酸塩」の組み合わせ処方です**
  液体ムヒアルファEXは、このような虫ささされ用に開発された新しいタイプの液体かゆみ止めです。炎症によく効くアンテドラッグ型抗炎症成分(PVA：プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル)に、すばやくかゆみをおさえる成分(ジフェンヒドラミン塩酸塩)を組み合わせた、効き目にこだわった処方です。ダニ・ノミ・毛虫・ムカデ・クラゲなどによる虫ささされ・かゆみにも効果を発揮します。

> PVAは、一般薬では効果の高いランクに分類されるステロイド成分です。患部ですぐれた抗炎症作用を発揮し、その後、低活性物質に変化します。そのため、ステロイド特有の副作用を起こしにくい特性を持っています。このような特性をアンテドラッグと呼びます。PVAは有効性と安全性のバランスにすぐれた成分です。

※液体ムヒアルファEXは、虫さされだけでなく、しっしんや皮ふ炎などの治療にも適しています。

- **スーッとする強い清涼感がかゆみをすばやくしずめます**
  2つの清涼感成分(ℓ-メントール、dℓ-カンフル)と液剤ならではのスーッとする強い清涼感により、かゆみをすばやくしずめます。
- **手が汚れず塗りやすい塗布栓タイプです**
  どんな時でもサッと塗れ、手が汚れない塗布栓タイプの使いやすい容器です。

使用上の注意

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1．次の部位には使用しないでください
⑴水痘(水ぼうそう)、みずむし・たむし等又は化膿している患部。
⑵創傷面、目の周囲、粘膜等。

2．ステロイド成分を含んでいるため、同じ部位に長期連用しないでください(目安として顔面で2週間以内、その他の部位で4週間以内)
特に顔面の広範囲に続けて長く使用すると赤ら顔のようになることがあります。

相談すること

1．次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください
⑴医師の治療を受けている人。
⑵本人又は家族がアレルギー体質の人。
⑶薬や化粧品等によりアレルギー症状(発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人。
⑷患部が広範囲の人。
⑸湿潤やただれのひどい人。

2．次の場合は、直ちに使用を中止し、この説明文書をもって医師又は薬剤師に相談してください
⑴使用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症　　状
皮　ふ	発疹・発赤、かゆみ、はれ
患　部	みずむし・たむし等の白せん症、にきび、化膿症状、持続的な刺激感

⑵5～6日間使用しても症状がよくならない場合。

効　能

虫ささされ、かゆみ、しっしん、皮ふ炎、かぶれ、じんましん、あせも

用法・用量

1日数回、適量を患部に塗布してください。

＜容器の使用方法＞

① 

塗布部を患部に数回ゆっくり押し当て、ラバーに薬液を充分しみ込ませてください。（薬液が出にくい場合は、手の甲など肌の固いところに押し当ててください。）

② 

薬液がラバーに充分しみ込んだことを確認した後、患部に塗布してください。

※同じ部位に他の軟膏・クリーム剤を併用するとラバーを傷めることがあります。

＜用法・用量に関連する注意＞

⑴定められた用法・用量を守ってください。

⑵小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。

⑶目に入らないように注意してください。万一目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合（充血や痛みが持続したり、涙が止まらない場合等）には、眼科医の診療を受けてください。

⑷本剤は外用にのみ使用し、内服しないでください。

成分とそのはたらき

有効成分（100mL中）

成　　分	分　量	は　た　ら　き
プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル(PVA)	0.15 g	アンテドラッグ型抗炎症成分で、はれ・赤みをしっかりおさえます。
ジフェンヒドラミン塩酸塩	1.0 g	かゆみ原因物質(ヒスタミン)のはたらきをブロックし、かゆみの元をおさえます。
l-メントール	3.5 g	清涼感を与え、かゆみをすばやくしずめます。
dl-カンフル	1.0 g	清涼感を与え、かゆみをすばやくしずめます。
イソプロピルメチルフェノール	0.1 g	殺菌作用があります。

添加物としてBHT、エタノールを含有します。

保管及び取扱い上の注意

⑴小児の手のとどかない所に保管してください。

⑵高温をさけ、直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。

⑶他の容器に入れかえないでください。（誤用の原因になったり品質が変わります。）

⑷火気に近づけないでください。

⑸次の物には付着させないでください。（変質する場合があります。）
床や家具などの塗装面、メガネ、時計、アクセサリー類、プラスチック類、化繊製品、皮革製品等。

⑹使用期限（ケース底面及び容器底面に西暦年と月を記載）をすぎた製品は使用しないでください。
使用期限内であっても、品質保持の点から開封後はなるべく早く使用してください。

⑺液もれを防ぐためキャップをしっかり閉めてください。

毒虫などに刺された場合の一般的な症状とお手当てのポイント

☆患部を清潔にしてから塗布してください。

☆赤くなってはれが大きい場合は、塗る回数を増やしたり、氷や水で冷やしてください。

☆患部をかきむしらないでください。かきむしると症状が悪化し、あとが残ることがあります。
早い対処で、かゆみや炎症をおさえることが大切です。

ダ　ニ	刺された1～2日後にかゆみ、はれ、赤みを生じ、数日間症状が続く場合が多い。
ノ　ミ	刺された数時間後にかゆみ、はれ、赤み、水疱を生じ、数日間症状が続く場合が多い。
毛　虫	刺された直後から、かゆみを伴う赤いブツブツが皮ふのあちこちに出現し、1～2日後にかゆみが強くなる場合が多い。肌に微細な刺毛が残ることがあるので、粘着テープ等を用いて軽く刺毛を取り除いてから塗布してください。
ムカデ	咬まれた瞬間に激しい痛みが生じる。その後、はれ、赤みが数日間続く場合が多い。
クラゲ	激しい痛みと線状にみみずばれ・赤みが生じる場合が多い。触手を取り除いてから多めに塗布してください。なお、触手を取り除く方法はクラゲの種類によって異なりますので、十分注意してください。

☆ハチに刺された場合は激しい灼熱痛を伴います。息苦しさ、全身倦怠、吐き気などの気配が見られた場合は、救急車などを呼び一刻も早く医師の手当てを受けてください。

☆症状がきわめてひどい場合や患部が広範囲なときは、液体ムヒアルファEXで対処できないことがあります。その場合は早めに医師に診てもらってください。

お客様相談窓口：株式会社 池田模範堂　〒930-0394　富山県中新川郡上市町神田16番地
076-472-0911〔電話受付時間：月～金（祝日を除く）9：00～17：00〕

製造販売元　株式会社 池田模範堂
富山県中新川郡上市町神田16番地

Ⓡ登録商標