

使用に際して、この説明文書を必ず読むこと
必要時に読めるように大切に保管すること

第2類医薬品

目のかゆみ・結膜充血に **爽AL目薬**

【爽AL目薬の特徴】

花粉やハウスダスト(室内のほこり、ダニ等)によるアレルギー等で目のかゆみや結膜充血等の不快な症状を起こす人が増えています。本剤には目のかゆみを緩和するクロルフェニラミンマレイン酸塩、結膜充血を取り除く塩酸テトラヒドロゾリン、炎症を鎮めるアラントイン、グリチルリチン酸二カリウム、目に栄養を与え、働きを活発にするタウリンを配合しています。



花粉やホコリ等で
目がかゆい・充血する



コンタクトレンズによる
目の不快感に



【使用上の注意】



相談すること

1. 次の人は使用前に医師または薬剤師にご相談ください
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 本人または家族がアレルギー体质の人
 - (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (4) 次の症状のある人
　　はげしい目のいたみ
 - (5) 次の診断を受けた人
　　緑内障
 2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師または薬剤師にご相談ください
 - (1) 使用後、次の症状があらわれた場合
- | 関係部位 | 症状 |
|------|-----------|
| 皮ふ | 発疹・発赤、かゆみ |
| 目 | 充血、かゆみ、はれ |
- (2) 目のかすみが改善されない場合
 - (3) 5~6日間使用しても症状がよくならない場合

【効能】

目のかゆみ、結膜充血、眼瞼炎(まぶたのただれ)、目の疲れ、眼病予防(水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど)、紫外線その他の光線による眼炎(雪目など)、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感、目のかすみ(目やにの多いときなど)

【使用法】

1回1~3滴、1日3~6回点眼してください

- (1) 過度に使用すると、異常なまぶしさを感じたり、かえって充血を招くことがあります
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください
- (3) 容器の先をまぶた、まつ毛に触れさせないでください。また、混濁したものは使用しないでください
- (4) ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないでください
- (5) 点眼用にのみ使用してください

【成分・分量】

本剤は、無色透明の液で、100mL中に次の成分を含有する

クロルフェニラミンマレイン酸塩	30mg
塩酸テトラヒドロゾリン	20mg
アラントイン	100mg
グリチルリチン酸二カリウム	100mg
タウリン	500mg

添加物：クエン酸水和物、ホウ酸、ホウ砂、等張化剤、エデト酸ナトリウム水和物、l-メントール、dl-カンフル、ゲラニオール、ポリソルベート80、プロピレングリコール、濃ベンザルコニウム塩化物液50

【保管および取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください
- (3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり、品質が変わる)
- (4) 他の人と共用しないでください
- (5) 表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。また、使用期限内であっても、開封後は、速やかに使用してください
- (6) 自動車の中や暖房器具の近く等、高温(40℃以上)の所に置かないでください(容器が変形することがある)

本品についてのお問い合わせは、下記にお願い致します

第一三共ヘルスケア株式会社 お客様相談室

〒103-8234 東京都中央区日本橋3-14-10

電話 03(5205)8331

受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

®登録商標



販売元
第一三共ヘルスケア株式会社
東京都中央区日本橋3-14-10

製造販売元
ティカ製薬株式会社
富山市荒川1-3-27