

使用前にこの説明文書を必ずお読み下さい。
また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

第2類医薬品

目のかゆみ・結膜充血に

特納用

爽[®]AL目薬

そう

爽AL目薬の特徴

花粉やハウスダスト(室内のほこり、ダニ等)によるアレルギー等で目のかゆみや充血等の不快な症状を起こす人が増えています。

本剤には目のかゆみを緩和するクロルフェニラミンマレイン酸塩、目の充血を抑える塩酸テトラヒドロゾリン、炎症をしずめるアラントイン、グリチルリチン酸二カリウム、目に栄養を与え、働きを活発にするタウリンを配合しています。



花粉やホコリ等で
目がかゆい・充血する



コンタクトレンズによる
目の不快感に

⚠ 使用上の注意



相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
 - 医師の治療を受けている人
 - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - 次の症状のある人
はげしい目の痛み
 - 次の診断を受けた人
緑内障

- 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ

- 次の場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
 - 目のかすみが改善されない場合
 - 5～6日間使用しても症状がよくなりません

効能・効果

目のかゆみ、結膜充血、眼瞼炎（まぶたのただれ）、目の疲れ、眼病予防（水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど）、紫外線その他の光線による眼炎（雪目など）、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感、目のかすみ（目やにの多いときなど）

使用法

1回1～3滴、1日3～6回点眼して下さい。

〈使用法に関連する注意〉

- (1)過度に使用すると、異常なまぶしさを感じたり、かえって充血を招くことがあります。
- (2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させて下さい。
- (3)容器の先をまぶた、まつ毛に触れさせないで下さい。また、混濁したものは使用しないで下さい。
- (4)ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないで下さい。
- (5)点眼用にのみ使用して下さい。

成分・分量

本剤は、無色澄明の液で、100m L中に次の成分を含有します。

成 分	分 量	はたらき
クロルフェニラミン マレイン酸塩	30mg	アレルギー症状を起こすヒスタミンの受容体結合をブロックし、目のかゆみを抑えます。
塩酸テトラヒドロゾリン	20mg	血管を収縮させて、目の充血を抑えます。
アラントイン	100mg	組織修復を助け、目の炎症をしずめます。
グリチルリチン酸 二カリウム	100mg	アレルギー反応による目の炎症をしずめます。
タウリン	500mg	新陳代謝を促進し、栄養成分が目の疲れをやわらげます。

添加物：クエン酸、ホウ酸、ホウ砂、等張化剤、エデト酸Na、*l*-メントール、*dl*-カンフル、ゲラニオール、ポリソルベート80、プロピレングリコール、濃ベンザルコニウム塩化物液50

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管して下さい。
- (2)小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3)他の容器に入れ替えないで下さい。（誤用の原因になったり品質が変わります）
- (4)他の人と共用しないで下さい。
- (5)表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。また、使用期限内であっても、開封後は、速やかに使用して下さい。
- (6)自動車の中や暖房器具の近く等、高温（40℃以上）の所に置かないで下さい。（容器が変形することがあります）

本品についてのお問い合わせは、下記にお願い致します。

第一三共ヘルスケア株式会社 お客様相談室
〒103-8234 東京都中央区日本橋3-14-10
電 話 0120-337-336
受付時間 9:00～17:00（土、日、祝日を除く）

®登録商標



販売元

第一三共ヘルスケア株式会社

Daiichi-Sankyo 東京都中央区日本橋3-14-10

製造販売元

テイカ製薬株式会社

富山市荒川1-3-27