

●ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください●

消炎・鎮痛令感パッピング

ラクスキットクール

第3類医薬品

⚠ 使用上の注意



してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

- 次の部位には使用しないでください
 - 目の周囲、粘膜等。
 - しつしん、かぶれ、傷口。



相談すること

- 次の人には使用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

- 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

効能・効果

腰痛、打撲、捻挫、肩こり、関節痛、筋肉痛、筋肉疲労、しもやけ、骨折痛

用法・用量

表面のプラスチックフィルムをはがし、1日1~2回、患部に貼付してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- 定められた用法・用量をお守りください。
- 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- 本剤は外用にのみ使用し、内服しないでください。
- 汗をかいしている時は、よくふきとてからお貼りください。
- 患部の広さに応じて、フィルムの上から適当な大きさにハサミで切ってご使用ください。

成分・分量 膏体100g中

成分	分量
サリチル酸メチル	0.5g
dL-カンフル	0.5g
l-メントール	0.3g

添加物として、ポリビニルアルコール(部分けん化物)、カルボキシビニルポリマー、ポリアクリル酸部分中和物、CMC-Na、D-ソルビトール、グリセリン、ソルビタンセスキオレイン酸エステル、ポリソルベート80、ケイ酸アルミニウムMg、カオリין、酸化チタン、エデト酸Na水和物、パラベンを含有します。

保管及び取扱い上の注意

- 小児の手の届かない所に保管してください。(2)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- 他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- 品質保持のため、未使用分は袋に入れ、開口部のファスナーをきちんと閉めて外気にふれないように保管してください。
- 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

発売元

大木製薬株式会社
東京都千代田区神田鍛冶町3-3

製造販売元

東光薬品工業株式会社
東京都足立区新田2-16-23

<お問い合わせ先>

本製品に関するお問い合わせは、下記までご連絡頂きますようお願い申し上げます。
東光薬品工業株式会社 03-3855-0101

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

<電話> 0120-149-931 (フリーダイヤル)



4 987030 195103

製造番号

B

使用期限