

消炎・鎮痛・温感バップ剤 ラックス kitt ホット

筋肉痛 関節痛 腰痛 肩こり

第3類医薬品 6枚入 保護フラスナー付き

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

特 徴

ラックス kitt ホットはサリチル酸メチル、*g*-カンフルによる消炎鎮痛効果と、トウガラシエキスの配合による温感効果を含ませ持ち、慢性的な腰痛、肩こり等に、優れた効果を見られます。

使用上の注意

❌ してはいけないこと（守らないと重大な副作用が起るほか、症状がひどくなります。）

- 1 次の部位には使用しないでください。
(1)目の周囲、粘膜等。(2)しっしん、かぶれ、傷口。

⚠ 確認すること

- 1 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください。
(1)本人又は家族がアレルギー体質の人。
(2)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 2 次の場合は直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。
(1)使用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、痛み

- (2)5～6日間使用しても症状がよくならない場合。

副作用等

本剤の使用中に痛みをともなう赤味を帯びた米粒大の水疱があらわれた場合には、ウイルスによる帯状疱疹であることが多く、副作用と間違えられることがあります。このような場合には使用を中止して、皮膚科専門医の診察を受けてください。

製造者

販売店

日

（お問い合わせ先）
本製品に関するお問い合わせは、
下記までご連絡ください。
お問い合わせ先
東光薬品工業株式会社
電話 03-39855-0101

成分・分量1000cal（固体100g）中

サリチル酸メチル	1.0g
<i>g</i> -カンフル	0.05g
トウガラシエキス	0.05g
添加物として、ポリビニルアルコール（部分けん化）、カルボキシビニルポリマー、ポリ アクリル酸部分中和物、DMC-HA、D-ソルビトール、グリセリン、セスキオレイン酸ジ メチル、ポリソルベート80、ケイ酸アルミン酸Mg、カオリン、酸化チタン、エタノール、 Na、パラベンを含有します。	
※添加物質量 2.5g	

効能・効果

腰痛、打撲、捻挫、肩こり、関節痛、筋肉痛、筋肉疲労、しむけ、骨折痛

用法・用量

- 患部のプラスチックフィルムをはがし、1日1～2回、患部に貼付してください。
（用法・用量に際する注意）
(1)定められた用法・用量をお守りください。
(2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
(3)本剤は外用にのみ使用し、内服しないでください。
(4)汗をかいている時は、よくふきとってから貼付ください。
(5)患部の広さに応じて、フィルムの上から適当な大きさにハサミで切ってご使
用ください。
(6)貼った患部をコタツや電気毛布等で温めないでください。
(7)入浴の30分以上前にははがしてください。

保管及び取扱い上の注意

- (1)小児の手が届かない所に保管してください。(2)直射日光の当たらない涼暗
の少ない涼しい所に保管してください。(3)他の容器に入れ替えないでください。
（誤用の原因になったり品質が変わることがあります。）(4)品質保持のため、未
使用分は袋に入れ、封口部のフラスナーをきちんと閉めて密封に保たないように保
管してください。(5)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

販売所

リブ・ラボラトリーズ株式会社

東京都中央区銀座2丁目1番2号

製造販売所

東光薬品工業株式会社

東京都中央区銀座2丁目1番23号

（販売所営業部製造課のお問い合わせ先）

（Eメール）
http://www.prls.co.jp/kenko/page/01
電話 03-5514-8831（フリーダイヤル）

