

●ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください●

消炎・鎮痛・温感バップ剤

ラクスキットホット

第3類医薬品

使用上の注意

× してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の部位には使用しないでください

- (1)目の周囲、粘膜等。
(2)しっしん、かぶれ、傷口。

● 初めすること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください

- (1)本人又は家族がアレルギー体質の人。
(2)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 次の場合は直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師又は薬剤師に相談してください

- (1)使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、痛み

(2)5～6日間使用しても症状がよくなる場合

禁忌・効果

頭痛、打撲、捻挫、肩こり、関節痛、筋肉痛、筋肉疲労、しもやけ、凍り傷

用法・用量

患部のプラスチックフィルムをはがし、1日1～2回、患部に貼付してください。

＜用法・用量に関する注意＞

(1)定められた用法・用量を守ってください。(2)水気には使用させず場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。(3)本剤は外用にのみ使用し、内服しないでください。(4)汗をかいている時は、よくふきとってから貼ってください。(5)患部の広さに応じて、フィルムの上から適当な大きさにハサミで切ってください。(6)貼った患部をコップや電気毛布等で温めないでください。(7)入浴の30分以上前にははがしてください。

成分・分量 単位100g中

成分	分量
サリチル酸メチル	1.0g
α-カンフル	0.5g
トウガラシエキス	0.05g*

*乾燥生薬重量 2.5g

添付薬として、ポリビニルアルコール(部分けん化型)、カルボキシビニルポリマー、ポリアクリル酸部分中酸、CMC-Na、D-ソルビコール、グリセリン、セスキオレイン酸ソルビタン、ポリソルベート80、クイックアルミン酸Mg、カオリン、酸化チタン、エタノールNa、パラベンを含有します。

保管及び取扱い上の注意

(1)10枚の平の箱が1箱に包装してください。(2)直射日光の当たらない涼しい場所に保管してください。(3)5年以内の賞効に入力がないでください。(4)開封の経路になったり品質がわるいことがあります。)(5)品質保持のため、未開封分は袋に入れ、開口部のファスナーをきちんと閉めて外箱に3枚綴り1箱のように保管してください。(6)開封状態を過ぎた製品は使用しないでください。

発売元

大木製薬株式会社

東京都千代田区神田新馬場3-3

製造販売元

東光薬品工業株式会社

東京都立川市新田2-18-23

＜お問い合わせ先＞

※製品に関するお問い合わせは、下記までご連絡ください。お問い合わせ先は、
東光薬品工業株式会社 03-3855-0101

※副作用被害救済制度のお問い合わせ先

＜電話＞ 0120-149-031 (フリーダイヤル)



4 987030 195110



A

製造番号

使用期限