

第2類医薬品



漢方煎専科

# 六味丸料

87

5日分15包



自然のちから、ひとに活かして  
株式会社 タキザワ漢方廠



## 漢方薬 六味丸料「タキザワ」

18A

## ⚠️&lt;使用上の注意&gt;



## 相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
  - 医師の治療を受けている人
  - 妊婦又は妊娠していると思われる人
  - 胃腸が弱く下痢しやすい人
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 

関係部位	症 状
消化器	食欲不振、胃部不快感、腹痛
- 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 

下痢
- 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合場合は服用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

## 【成分・分量】

ジ オ ウ……………5.0g タクシャ……………3.0g  
 サンシュユ……………3.0g ブクリョウ……………3.0g  
 サンヤク……………3.0g ボタンビ……………3.0g  
 1日分(1包6.67g×3) 20.0g

## 【効能・効果】

体力中等度以下で、疲れやすく尿量減少又は多尿で、ときに手足のほてり、口渴があるものの次の諸症：  
 排尿困難、残尿感、頻尿、むくみ、かゆみ、夜尿症、しびれ

## 【用法・用量】

1日3回食間あるいは食前の空腹時に、本品1包(1回分)を和紙袋入りのまま、水約200mLを加えて半量ぐらいまで煮つめ、和紙袋を除き、次の量を服用してください。

年 齢	1回量
成人(15歳以上)	全量
15歳未満7歳以上	成人の2/3
7歳未満4歳以上	成人の1/2
4歳未満	服用しないこと

## &lt;用法・用量に関連する注意&gt;

- 用法・用量を厳守してください。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

## 【保管及び取扱い上の注意】

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。  
(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)



製造販売元

株式会社 タキザワ漢方廠

さいたま市大宮区堀の内町2丁目623-1  
 お客様相談室 ☎048-688-7923  
 受付時間：9時～18時(月～金)

タキザワ漢方



ホームページ:takizawa.asia

副作用被害救済制度の問合せ先

(独)医薬品医療機器総合機構

[http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai\\_camp/index.html](http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html)

☎0120-149-931



4 974961 180674