



効能・効果

しみ (肝斑に限る)

用法・用量

次の量を水又はお湯で服用して下さい。

年齢	1回量	1日服用回数
成人 (15歳以上)	2錠 	3回 食後に服用して下さい。
15歳未満	服用しないで下さい。	

<用法・用量に関連する注意>

- 用法・用量を厳守して下さい。
- 錠剤の取り出し方：右図のように錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用して下さい。(誤ってそのまま飲み込んだりすると、食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります)



成分・分量

6錠中

成分	分量
トラネキサム酸	750mg
L-システイン	240mg
アスコルビン酸 (ビタミンC)	300mg
ピリドキシン塩酸塩 (ビタミンB6)	6mg
パントテン酸カルシウム	24mg

添加物：乳酸Ca、結晶セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸Mg、ヒプロメロース、マクロゴール、酸化チタン、タルク、カルナウバロウ

<成分・分量に関連する注意>

本剤の服用により、尿及び便の検査値に影響を与えることがあります。医師の検査を受ける場合は、ビタミンCを含有する製剤を服用していることを医師に知らせて下さい。

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
- 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- 他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わります)
- 内袋 (アルミ袋) の中に活性炭シートが入っています。服用しないで下さい。
- 表示の使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。また、使用期限内であっても内袋 (アルミ袋) 開封後は品質保持の点からなるべく早く服用して下さい。

しみを効果的に改善するために

紫外線を慢性的に浴びることはしみ、しわ等の皮膚の老化につながります。夏でも長袖のシャツを着たり、帽子やサングラス、日傘を利用しましょう。また、日焼け止めクリームを使用する等、紫外線に注意しましょう。

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い致します。

第一三共ヘルスケア株式会社 トランシーノ相談室


〒103-8234 東京都中央区日本橋3-14-10

電話 0120-013-416

受付時間 9:00~17:00 (土、日、祝日を除く)

肝斑とは

肝斑 (かんぱん) とは、女性の顔面に多く生じるしみで、妊娠、経口避妊薬などにより誘発あるいは悪化するので、女性ホルモンが関連して発症するといわれています。紫外線で少し悪化します。薄い褐色でやや大きく、ほぼ骨に沿って左右対称にできるのが特徴的です。高齢者ではほとんど見られないといわれています。また、レーザー治療で悪化するといわれています。



●その他、肝斑に似ているしみとして、リール黒皮症といわれる、化粧品のかぶり返し使用でできる色素沈着等もありますが、肝斑ではありません。

トランシーノについて詳しくは [www.transino.jp](http://www.transino.jp)

06 登録商標

販売元  
第一三共ヘルスケア株式会社  
Daiichi-Sankyo 東京都中央区日本橋3-14-10  
ホームページ <http://www.daiichisankyo-hc.co.jp/>

製造販売元  
ダイト株式会社  
富山県富山市八日町326番地