

服用前に説明書きを必ずお読み下さい。
また、大切に保管して下さい。

使用上の注意

ここを押して開ける



【相談すること】

- 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談して下さい：医師の治療を受けている人
- 次の場合は、直ちに服用を中止し、この商品を持って医師、歯科医師又は薬剤師に相談して下さい

(1)服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	悪心・嘔吐、胃部不快感

(2)1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合

- 生理が予定より早くきたり、経血量がやや多くなったりすることがあります。出血が長く続く場合は、医師又は薬剤師に相談して下さい
- 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談して下さい：便秘、下痢

【効能効果】

- 末梢血行障害による次の諸症状の緩和：肩・首すじのこり、手足のしびれ・冷え、しもやけ
 - 次の諸症状の緩和：しみ、そばかす、日やけ・かぶれによる色素沈着
 - 次の場合の出血予防：歯ぐきからの出血、鼻出血
- 「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師、薬剤師又は歯科医師に相談して下さい。」
- 次の場合のビタミンECの補給：肉体疲労時、病中病後の体力低下時、老年期

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。(2)小児の手の届かない所に保管して下さい。(3)他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用して下さい。
- (5)表示の期限内に服用して下さい。

テルクスEC顆粒ハイ 80包(1包1.8g)

【成分分量】

3包(成人1日量)中

酢酸d-α-トコフェロール(天然型ビタミンE).....300mg
アスコルビン酸(ビタミンC).....2000mg
リボフラビン酸エステル(ビタミンB2).....12mg
ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB6).....50mg
ニコチン酸.....12mg

添加物としてアスパルテーム(L-フェニルアラニン化合物)、エリスリトール、乳糖、酸化チタン、トウモロコシデンプン、ヒドロキシプロピルセルロース、香料、ビタミンEを含有します。

●配合成分のリボフラビン酸エステルにより、尿が黄色になることがあります。

【用法用量】

成人(15才以上).....1回1包
11才以上15才未満.....1回2/3包
7才以上11才未満.....1回1/2包
3才以上7才未満.....1回1/3包
1才以上3才未満.....1回1/4包
1日3回、4時間以上の間隔を置いて服用して下さい。

●用法用量に関連する注意

- (1)用法用量をお守り下さい。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。

■お問い合わせ先

滋賀県製薬株式会社 ぐすり相談室
電 話：(0748)88-3180(大代表)
受付時間：9時から17時まで
(土、日、祝日を除く)

製造販売元



滋賀県製薬株式会社
滋賀県甲賀市甲賀町滝879

登録商標



使用期限

製造番号