

天然型ビタミンE300mg 1日量
ビタミンC2000mg

EC B₂ B₆

デルクスEC顆粒ハイ 80包

しみ そばかす
肩こり 手足の冷え
シュガーフリー / ナトリウムフリー

第3類医薬品

服用前に説明書きを必ずお読み下さい。
また、大切に保管して下さい。

⚠ 使用上の注意



【相談すること】

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい
(1)医師の治療を受けている人
(2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この商品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい
- | 関係部位 | 症 状 |
|-------|--------------|
| 皮 膚 | 発疹・発赤、かゆみ |
| 消 化 器 | 吐き気・嘔吐、胃部不快感 |
- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい：便秘、下痢
 - 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この商品を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい
 - 服用後、生理が予定より早くきたり、経血量がやや多くなったりすることがあります。出血が長く続く場合は、医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

【効能効果】

- 末梢血行障害による次の諸症状の緩和：肩・首すじのこり、手足のしびれ・冷え、しもやけ
 - 次の諸症状の緩和：しみ、そばかす、日やけ・かぶれによる色素沈着
 - 次の場合の出血予防：歯ぐきからの出血、鼻出血
- 「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師、薬剤師又は歯科医師に相談して下さい。」
- 次の場合のビタミンECの補給：肉体疲労時、病中病後の体力低下時、老年期

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
- (2)小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3)他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用して下さい。
- (5)表示の期限内に服用して下さい。

ここを押して開ける

第3類医薬品

デルクスEC顆粒ハイ 80包(1包1.8g)

【成分分量】

3包(成人1日量)中

酢酸d-α-トコフェロール(天然型ビタミンE).....300mg
 アスコルビン酸(ビタミンC).....2000mg
 リボフラビン酸エステル(ビタミンB₂).....12mg
 ビリドキシン塩酸塩(ビタミンB₆).....50mg
 ニコチン酸.....12mg
 添加物としてアスパルテーム(L-フェニルアラニン化合物)、
 エリスリトール、乳糖、酸化チタン、トウモロコシデンプン、
 ヒドロキシプロピルセルロース、香料、ビタミンEを含有します。
 ●配合成分のリボフラビン酸エステルにより、尿が黄色になることがあります。

【用法用量】

成人(15才以上).....1回 1包
 11才以上15才未満.....1回 2/3包
 7才以上11才未満.....1回 1/2包
 3才以上7才未満.....1回 1/3包
 1才以上3才未満.....1回 1/4包
 1日3回、4時間以上の間隔をおいて服用して下さい。

●用法用量に関連する注意

- (1)用法用量をお守り下さい。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。

■お問い合わせ先

滋賀県製薬株式会社 <すり相談室>
 電 話：(0748)88-3180(大代表)
 受付時間：9時から17時まで
 (土、日、祝日を除く)

製造販売元



滋賀県製薬株式会社
 滋賀県甲賀市甲賀町南879

副作用救済制度 ☎ 0120-149-931

使用期限

製造番号

