

医薬品

葛根湯液 SX

服用前に説明書きをよくお読み下さい。
また、大切に保管して下さい。

【使用上の注意】

❗ **してはいけないこと** (守らないと現在の症状が悪化したり副作用・事故が起こりやすくなります)
長期連用しないして下さい

● **相談すること**

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談して下さい
(1) 医師の治療を受けている人 (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人 (3) 体の虚弱な人 (体力の衰えている人、体の弱い人) (4) 胃腸の弱い人 (5) 発汗傾向の著しい人 (6) 高齢者 (7) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人 (8) 次の症状のある人：むくみ、排尿困難 (9) 次の診断を受けた人：高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この商品を持って医師又は薬剤師に相談して下さい

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。
その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。
肝機能障害	全身のだるさ、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)等があらわれる。

(2) 5～6回服用しても症状がよくならない場合

【効能効果】

かぜの初期の諸症状(発熱、さむけ、頭痛、肩・首筋のこわばり、鼻づまり、鼻水、のどの痛み)

【用法用量】

成人(15才以上) 1回1本、1日3回食間によく振ってから服用して下さい。

● **用法用量に関連する注意**

(1) 用法用量を厳守して下さい。

(2) 本品は1回に1本を飲みきり、分割服用はしないで下さい。

【成分分量】 90mL(30mL×3本)中

葛根湯エキスを 4340mg

カッコン8.0g、マオウ4.0g、タイソウ4.0g、
ケイヒ3.0g、シヤクヤク3.0g、カンゾウ2.0g、
ショウキョウ1.0g

添加物として白糖、D-ソルビトール、ハチミツ、
安息香酸Na、パラベン、ステアリン酸ポリオキシル、香料を含有します。

【保管及び取扱い上の注意】

(1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管して下さい。

(2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。

(3) 他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わります。)

(4) 表示の期限内に服用して下さい。

● 配合成分により、沈殿を生じることがあります。
よく振って服用して下さい。

■ お問い合わせ先

滋賀県製薬株式会社 <すり相談室>

電 話：(0748) 88-3180(大代表)

受付時間：9時から17時まで(土、日、祝日を除く)

製造販売元



滋賀県製薬株式会社
滋賀県甲賀市甲賀町通879

