

感冒用
葛根湯液 シロップ
タイプ

第2類医薬品

感冒用

葛根湯液

シロップ
タイプ

眠くなる成分は入っていません

発熱

30mL

鼻水

30mL

のどの
痛みに

30mL

30mL×3本 (1日分)

感冒用
葛根湯液

シロップタイプ

発熱・鼻水

のどの痛み

30mL



4 974042 202981

使用期限

製造番号

085EP70

第2類医薬品 葛根湯液 SX



服用前に説明書きをよくお読み下さい。
また、大切に保管して下さい。

【使用上の注意】

- ❌ **してはいけないこと** (守らないと現在の症状が悪化したり副作用・事故が起こりやすくなります)
長期連用しないで下さい

※ **相談すること**

1. 次の人**は服用前に医師又は薬剤師に相談して下さい**(1) 医師の治療を受けている人(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人(3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)(4) 胃腸の弱い人(5) 発汗傾向の著しい人(6) 高齢者(7) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人(8) 次の症状のある人：むくみ、排尿困難(9) 次の診断を受けた人：高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この商品を持って**医師又は薬剤師に相談して下さい**

- (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。
その場合は直ちに医師の診察を受けて下さい。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症	尿量が減少する。顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる。手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。
肝機能障害	全身のだるさ、黄疸(皮ふや白目が黄色くなる)等があらわれる。

- (2) 5～6回服用しても症状がよくなりえない場合

【効能効果】

かぜの初期の諸症状(発熱、さむけ、頭痛、肩・首筋のこわばり、鼻づまり、鼻水、のどの痛み)

【用法用量】

成人(15才以上) 1回1本、1日3回食間によく振ってから服用して下さい。

●用法用量に関連する注意

(1) 用法用量を厳守して下さい。

(2) 本品は1回に1本を飲みきり、分割服用はしないで下さい。

【成分量】 90mL(30mL×3本) 中

葛根湯エキス 4340mg
カッコン8.0g、マオウ4.0g、タイソウ4.0g、
ケイヒ3.0g、シャクヤク3.0g、カンソウ2.0g、
ショウキョウ1.0g

添加物として白糖、D-ソルビトール、ハチミツ、
安息香酸Na、パラベン、ステアリン酸ポリオキシル、香料を含有します。

【保管及び取扱い上の注意】

(1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管して下さい。

(2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。

(3) 他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わります。)

(4) 表示の期限内に服用して下さい。

●配合成分により、沈殿を生じることがあります。
よく振って服用して下さい。

■お問い合わせ先

滋賀県製薬株式会社 くすり相談室

電 話：(0748) 88-3180(大代表)

受付時間：9時から17時まで(土、日、祝日を除く)

副作用救済制度 ☎ 0120-149-931

製造販売元



滋賀県製薬株式会社
滋賀県甲賀市甲賀町南879



さ ん け



発 熱



鼻 水



の どの 痛み