

ご使用前にこの添付文書を必ずお読み下さい。また、大切に保管して下さい。

抗菌目薬

第2類医薬品

ものもらい・結膜炎に

# ワイビー®抗菌EX

ワイビー 抗菌EXは、  
抗菌作用や抗炎症作用  
をもつ成分を配合した  
抗菌目薬です。




結膜やまぶたが、細菌  
等に感染しておこる  
不快な症状（ものもらい、  
結膜炎等）に効果をあら  
わします。



ものもらい



結膜炎



まぶたのただれ



## 使用上の注意



### 【してはいけないこと】

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります）

長期連用しないで下さい



### 【相談すること】

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (3) 次の症状のある人  
はげしい目の痛み

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

| 関係部位 | 症 状       |
|------|-----------|
| 皮 膚  | 発疹・発赤、かゆみ |
| 目    | 充血、かゆみ、はれ |

3. 3～4日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

## 【効能効果】

結膜炎（はやり目）、ものもらい、眼瞼炎（まぶたのただれ）、目のかゆみ

## 〔用法用量〕

1回1～3滴、1日3～6回点眼して下さい。

### ＜用法用量に関連する注意＞

- (1) 用法用量を厳守して下さい。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させて下さい。
- (3) 容器の先をまぶた、まつ毛に触れさせないで下さい。また、混濁したものは使用しないで下さい。
- (4) ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないで下さい。
- (5) 点眼用にのみ使用して下さい。



容器の先が目やまつ毛に触れないようにして下さい。


## 〔成分分量〕 100mL中

| 成 分                  | 分 量    | 作 用                         |
|----------------------|--------|-----------------------------|
| スルファメトキサゾール<br>ナトリウム | 4000mg | 細菌に対する適応範囲が<br>広い持続型の抗菌薬です。 |
| イブシロンーアミノカブロン酸       | 1000mg | アレルギー等による目の<br>炎症を鎮めます。     |
| グリチルリチン酸<br>二カリウム    | 150mg  | 目の炎症を抑えます。                  |
| クロルフェニラミン<br>マレイン酸塩  | 30mg   | 目の炎症を鎮め、目の<br>かゆみや充血を除きます。  |

添加物としてホウ砂、エデト酸Na、パラベン、ヒプロメロースを含有します。

## 〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管して下さい。特に車中・暖房器具の近く等40℃以上になる場所に放置しないで下さい。（高温の所に放置すると、容器が変形したり品質に影響するおそれがあります。）
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。（誤用の原因になったり品質が変わります。）
- (4) 他の人と共用しないで下さい。
- (5) 表示の期限内にご使用下さい。



### ■お問い合わせ先

滋賀県製薬株式会社 くすり相談室  
電 話：(0748) 88-3180 (大代表)  
受付時間：9時から17時まで（土、日、祝日を除く）

### 副作用被害救済制度のお問い合わせ先

（独）医薬品医療機器総合機構  
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>  
電話 0120-149-931（フリーダイヤル）

製造販売元



**滋賀県製薬株式会社**

滋賀県甲賀市甲賀町滝879