

ご使用前にこの添付文書を必ずお読み下さい。また、大切に保管して下さい。

抗菌目薬

第2類医薬品

ものもらい・結膜炎に ワイビー®抗菌EX


ワイビー 抗菌EXは、
抗菌作用や抗炎症作用
をもつ成分を配合した
抗菌目薬です。



結膜やまぶたが、細菌
等に感染しておこる
不快な症状(ものもらい、
結膜炎等)に効果をあら
わします。



ものもらい



結膜炎



まぶたのただれ



使用上の注意



【してはいけないこと】

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

長期連用しないで下さい



【相談すること】

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (3) 次の症状のある人
はげしい目の痛み

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ

3. 3～4日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

【効能効果】

結膜炎（はやり目）、ものもらい、眼瞼炎（まぶたのただれ）、目のかゆみ

【用法用量】

1回1～3滴、1日3～6回点眼して下さい。

<用法用量に関連する注意>

- (1) 用法用量を厳守して下さい。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用して下さい。
- (3) 容器の先をまぶた、まつ毛に触れさせないで下さい。また、混濁したものは使用しないで下さい。
- (4) ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないで下さい。
- (5) 点眼用にのみ使用して下さい。



【成分分量】100mL中

成分	分量	はたらき
スルファメトキサゾールナトリウム	4000mg	細菌感染によるものもらい、結膜炎に効果があります。
イブシロンーアミノカブロン酸	1000mg	抗炎症作用により、眼瞼炎に効果があります。
グリチルリチン酸二カリウム	150mg	目の炎症をおさえます。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	30mg	抗ヒスタミン作用により、目のかゆみをやわらげます。

添加物としてホウ砂、エデト酸Na、パラベン、ヒプロメロースを含有します。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管して下さい。特に車中・暖房器具の近く等40℃以上になる場所に放置しないで下さい。(高温の所に放置すると、容器が変形したり品質に影響するおそれがあります。)
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 他の人と共用しないで下さい。
- (5) 表示の期限内にご使用下さい。
- (6) 保存の状態によっては、成分の結晶が容器の先やキャップの内側につくことがあります。その場合には清潔なガーゼ等で軽くふきとってご使用下さい。



■お問い合わせ先

滋賀県製薬株式会社 くすり相談室
電話：(0748) 88-3180 (大代表)
受付時間：9時から17時まで(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度のお問い合わせ先
(独) 医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/>
電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)

製造販売元



滋賀県製薬株式会社
滋賀県甲賀市甲賀町滝879