

販売名:葛根湯液

△ 使用上の注意 **■ 相談すること** 1.次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください(1)医師の治療を受けている人。(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。(3)体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)。(4)胃腸の弱い人。(5)発汗傾向の著しい人。(6)高齢者。(7)今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。(8)次の症状のある人。むくみ、排尿困難(9)次の診断を受けた人。高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害 2.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください(皮膚)発疹・発赤、かゆみ(消化器)吐き気、食欲不振、胃部不快感 まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。(偽アルドステロン症、ミオパチー)手足のだるさ、しびれ、つばり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。(肝機能障害)発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。3.1ヵ月位(感冒の初期、鼻かぜ、頭痛に服用する場合には5~6回)服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください 4.長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください【用法・用量】成人(15才以上)10mL、7才以上15才未満5mLを1日3回食前又は食間に服用してください。(7才未満は服用しないこと)〈用法・用量に関連する注意〉(1)定められた用法・用量を厳守してください。(2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。(3)食間とは食後2~3時間を指します。(4)本剤は本質的に沈澱を含んでいますので、服用前によく振ってから服用してください。(5)添付のカップをご利用ください。

第2類医薬品

漢方製剤

葛根湯液

カッコントウ
30mL

【効能・効果】

体力中等度以上のものの次の諸症：感冒の初期(汗をかいていないもの)、鼻かぜ、鼻炎、頭痛、肩こり、筋肉痛、手や肩の痛み

ジェービーエス製薬株式会社

製造販売元 栃木県芳賀郡芳賀町芳賀台196-1
発売元 横浜市都筑区東山田4-42-22

お客様相談室 ☎045(593)2136

【成分・分量】

1日量(1本(30mL))中
日局葛根湯エキス 2.4g
日局カッコン 4g
日局マオウ 3g
日局タイソウ 3g
日局ショウキョウ 2g
日局ケイヒ 2g
日局シャクヤク 2g
日局カンソウ 2g

に相当

添加物DL-リンゴ酸、クエン酸、白糖、D-ソルビトール、安息香酸Na

【保管及び取扱い上の注意】

(1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)(4)封をあけたまま保存しないでください。(5)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

ガラス:瓶 金属:キャップ

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

製造番号

使用期限

