

ハイカイゲンカゼカプセル

項目	内容
医薬品区分	一般用医薬品
薬効分類	かぜ薬(内用)
製品名	ハイカイゲンかぜカプセル
製品名(読み)	ハイカイゲンカゼカプセル
製品の特徴	ハイカイゲンかぜカプセルは、アセトアミノフェン、d-クロルフェニラミンマレイン酸塩、dl-メチルエフェドリン塩酸塩などの成分に加えて、4種類の和漢生薬を配合して、かぜによる不快な症状を緩和する効果を高めています。
使用上の注意	<p>■してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)</p> <ol style="list-style-type: none">次の人は服用しないでください (1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。 (2)本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください 他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください (眠気等があらわれることがあります。)服用前後は飲酒しないでください長期連用しないでください <p>■相談すること</p> <ol style="list-style-type: none">次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください (1)医師又は歯科医師の治療を受けている人。

(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。

(3) 授乳中の人。

(4) 高齢者。

(5) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

(6) 次の症状のある人。

高熱, 排尿困難

(7) 次の診断を受けた人。

甲状腺機能障害, 糖尿病, 心臓病, 高血圧, 肝臓病, 腎臓病,
胃・十二指腸潰瘍, 緑内障

2. 服用後, 次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので, 直ちに服用を中止し, この説明文書を持って医師, 薬剤師又は登録販売者に相談してください

[関係部位: 症状]

○皮膚: 発疹・発赤, かゆみ

○消化器: 吐き気・嘔吐, 食欲不振

○精神神経系: めまい

○呼吸器: 息切れ, 息苦しさ

○泌尿器: 排尿困難

○その他: 過度の体温低下

まれに次の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

[症状の名称: 症状]

○ショック(アナフィラキシー): 服用後すぐに, 皮膚のかゆみ, じんましん, 声のかすれ, くしゃみ, のどのかゆみ, 息苦しさ, 動悸, 意識の混濁等があらわれる。

○皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群), 中毒性表皮壊死融解症, 急性汎発性発疹性膿疱症: 高熱, 目の充血, 目やに, 唇のただれ, のどの痛み, 皮膚の広範囲の発疹・発赤, 赤くなった皮膚上に小さなブツブツ(小膿疱)が出る, 全身がだるい, 食欲がない等が持続したり, 急激に悪化する。

○薬剤性過敏症症候群: 皮膚が広い範囲で赤くなる, 全身性の発疹, 発熱, 体がだるい, リンパ節(首, わきの下, 股の付け根等)のはれ等があらわれる。

○肝機能障害: 発熱, かゆみ, 発疹, 黄疸(皮膚や白目が黄色くなる), 褐色尿, 全身のだるさ, 食欲不振等があらわれる。

○腎障害: 発熱, 発疹, 尿量の減少, 全身のむくみ, 全身のだるさ, 関節痛(節々が痛む), 下痢等があらわれる。

	<p>○間質性肺炎：階段を上ったり，少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる，空せき，発熱等がみられ，これらが急にあらわれたり，持続したりする。</p> <p>○ぜんそく：息をするときゼーゼー，ヒューヒューと鳴る，息苦しい等があらわれる。</p> <p>○再生不良性貧血：青あざ，鼻血，歯ぐきの出血，発熱，皮膚や粘膜が青白くみえる，疲労感，動悸，息切れ，気分が悪くなりくらっとする，血尿等があらわれる。</p> <p>○無顆粒球症：突然の高熱，さむけ，のどの痛み等があらわれる。</p> <p>3. 服用後，次の症状があらわれることがありますので，このような症状の持続又は増強が見られた場合には，服用を中止し，この説明文書を持って医師，薬剤師又は登録販売者に相談してください</p> <p style="padding-left: 40px;">口のかわき，眠気</p> <p>4. 5～6 回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し，この説明文書を持って医師，薬剤師又は登録販売者に相談してください</p>									
<p>効能・効果</p>	<p>かぜの諸症状(発熱，鼻水，鼻づまり，のどの痛み，せき，たん，頭痛，くしゃみ，悪寒，関節の痛み，筋肉の痛み)の緩和</p>									
<p>用法・用量</p>	<p>次の 1 回量を，食後なるべく 30 分以内に服用してください。</p> <p>[年齢：1 回量：1 日服用回数]</p> <p>○成人(15 才以上)：2 カプセル：3 回</p> <p>○7 才以上 15 才未満：1 カプセル：3 回</p> <p>○7 才未満：服用させないこと</p>									
<p>用法関連注意</p>	<p>(1)用法・用量を厳守してください。</p> <p>(2)小児に服用させる場合には，保護者の指導監督のもとに服用させてください。</p> <p>(3)カプセルの取り出し方</p> <p>カプセルの入っている PTP シートの凸部を指先で強く押して，裏面のアルミ箔を破り，取り出して服用してください。</p> <p>(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります。)</p>									
<p>成分分量</p>	<p>6 カプセル(成人 1 日量)中</p> <table border="1" data-bbox="443 1879 1428 2056"> <thead> <tr> <th>成分</th> <th>分量</th> <th>内訳</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>アセトアミノフェン</td> <td>770mg</td> <td></td> </tr> <tr> <td>d-クロルフェニラミンマレイン酸塩</td> <td>3.5mg</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	成分	分量	内訳	アセトアミノフェン	770mg		d-クロルフェニラミンマレイン酸塩	3.5mg	
成分	分量	内訳								
アセトアミノフェン	770mg									
d-クロルフェニラミンマレイン酸塩	3.5mg									

	デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物	48mg	
	dl-メチルエフェドリン塩酸塩	60mg	
	無水カフェイン	75mg	
	ビスベンチアミン	10mg	
	リボフラビン	6mg	
	オウヒエキス	40mg	(オウヒ 666.8mg)
	ケイヒ末	150mg	
	ゴオウ	3mg	
	地竜エキス散	210mg	(ジリュウ 420mg)
添加物	バレイショデンプン, トウモロコシデンプン, 乳糖, セルロース, 炭酸カルシウム, タルク, カルメロースナトリウム(CMC-Na), カルメロースカルシウム(CMC-Ca), デンプングリコール酸ナトリウム, ヒドロキシプロピルセルロース, ステアリン酸ポリオキシル, デヒドロ酢酸ナトリウム, ゼラチン, ラウリル硫酸ナトリウム		
保管及び取扱い上の注意	<p>(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。</p> <p>(2) 小児の手の届かない所に保管してください。</p> <p>(3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)</p> <p>(4) 外箱に表示の使用期限が過ぎた製品は服用しないでください。</p>		
消費者相談窓口	<p>会社名: カイゲンファーマ株式会社</p> <p>問い合わせ先: お客様相談室</p> <p>電話: 06-6202-8911</p> <p>受付時間: 9:00~17:00(土曜, 日曜, 祝日を除く)</p>		
製造販売会社	<p>第一薬品工業株式会社</p> <p>〒931-8515 富山県富山市草島 15-1</p>		
販売会社	カイゲンファーマ株式会社		
剤形	カプセル		
リスク区分等	第「2」類医薬品		