

御嶽山風邪薬

第2類医薬品

風邪はごくありふれた病気の一つですが、こじらせると体調を大きく崩し、他のいろいろな病気にかかりやすくなります。そのため風邪は“早めに治す”ことが大切なのです。

御嶽山風邪薬は

風邪の初期症状に効果のある漢方薬の“葛根湯エキス粉末”と、発熱、頭痛、鼻水、咳などを鎮める西洋薬を組み合わせることで、風邪の諸症状がより早く改善されるように配合されています。



使用上の注意

❌【してはいけないこと】

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

1. 次の人は服用しないでください。

- (1) 本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人
- (2) 本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人

2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください。

他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬）

3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。

(眠気があらわれることがある)

4. 服用時は飲酒しないでください。

5. 長期連用しないでください。



■【相談すること】

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください。

- (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
- (3) 水痘(水ぼうそう)もしくはインフルエンザにかかっている又はその疑いのある乳・幼・小児(15歳未満)
- (4) 高齢者
- (5) 本人又は家族がアレルギー体質の人
- (6) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (7) 次の症状のある人 高熱、排尿困難
- (8) 次の診断を受けた人

甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師に相談してください。

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	悪心・嘔吐、食欲不振
精 神 神 経 系	めまい
そ の 他	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しき等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群)、 中毒性表皮壊死症 (ライエル症候群)	高熱を伴って、発疹・発赤、火傷様の水ぶくれ等の激しい症状が、全身の皮ふ、口や目の粘膜にあらわれる。
肝機能障害	全身のだるさ、黄疸(皮ふや白目が黄色くなる)等があらわれる。
間質性肺炎	空せき(たんを伴わないせき)を伴い、息切れ、呼吸困難、発熱等があらわれる。(これらの症状は、かぜの諸症状と区別が難しいこともあり、空せき、発熱等の症状が悪化した場合にも、服用を中止するとともに、医師の診療を受けること。)
ぜんそく	

(2) 5～6回服用しても症状がよくならない場合

3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください。

口のかわき

効 能 ・ 効 果

かぜの諸症状(鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和

用 法 ・ 用 量

次の量を、1日3回食後なるべく30分以内に服用してください。

年 齢	1 回 量	1 日服用回数
成人(15歳以上)	1 包	3 回
11歳以上15歳未満	2/3包	
7 歳以上11歳未満	1/2包	
5 歳以上 7 歳未満	1/3包	
5 歳未満	服用しないこと	

【用法・用量に関連する注意】

- 定められた用法、用量をお守りください。
- 小児に服用させる場合には保護者の指導監督のもとに服用させてください。

成 分 ・ 分 量

1日量3包(1包1.5g)中

成 分	含 量
葛根湯エキスパウダー	1,800mg
日局カッコン ……………3.0g 日局カンゾウ……………0.75g 日局ケイヒ ……………1.125g 日局シャクヤク ……1.125g 日局ショウキョウ ……0.375g 日局タイソウ ……………1.5g 日局マオウ ……………1.5g	
エテンザミド	900mg
クロルフェニラミンマレイン酸塩	7.5mg
チペジジンヒベンズ酸塩	65mg

添加物としてポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール、ヒドロキシプロピルセルロース、乳糖、二酸化ケイ素を含有します。

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れかえないでください(誤用の原因になったり品質が変わります)。
- 1包を分割した残りを使用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に使用してください。
- 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

お問い合わせ先

製品の使い方・内容について

大峰堂薬品工業株式会社

電話番号 0745-22-3601

製品のお買い求めについて

日野製薬株式会社

電話番号 0264-36-3311

お客様相談窓口

受付時間 9:00より17:00(土・日・祝日を除く)

お客様係

受付時間 9:00より16:00(土・日・祝日を除く)

発売元

日 野 製 薬 株 式 会 社

長野県木曽郡木祖村大字藪原1598

製造販売元

大 峰 堂 薬 品 工 業 株 式 会 社

奈良県大和高田市根成柿574番地