

1298 CE-0
YARCO4

第3類医薬品

販売名：
サロンパス®
ローション

ここを
押し開けて
ください。

第3類医薬品

ご使用に際して、この箱の説明書を必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

特長

- 有効成分サリチル酸グリコールにより肩こり、筋肉痛にすぐれた効果を発揮します。
- スーッと心地よいサロンパスの刺激がコリをほぐします(爽快刺激感処方)。
- “らく塗り”ボトル採用で塗りにくい部位にも楽に塗布できます。
- 微香性なので外出先でも安心してご使用いただけます。

※塗布した後、運動などをすると、強い刺激(ヒリヒリ感)を感じる事があります。
刺激が強すぎる時は使用を中止してください。石けんで洗い流すと刺激は緩和します。

使用上の注意

❌してはいけないこと

[守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。]

次の部位には使用しないでください。

- (1) 目の周囲、粘膜(口のまわり等)など。
- (2) 湿疹、かぶれ、ただれ、傷口、化膿部位。

相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください。

- (1) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (2) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師又は薬剤師に相談してください。

- (1) 使用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、痛み

- (2) 5～6日間使用しても症状がよくならない場合。

火気厳禁

第二石油類 水溶性 危険等級Ⅲ (エタノール、プロピレングリコール)

成分・分量

100g中に次の成分を含んでいます。
サリチル酸グリコール……3.0g
ノナン酸バニリルアミド……0.015g
ニコチン酸ベンジルエステル……0.02g
グリチルレチン酸……0.05g
L-メントール……5.0g
添加物として、エタノール、プロピレングリコールを含有します。

保管及び取り扱い上の注意

- (1) 使用後は、必ずキャップを十分に閉めて、直射日光を避け、涼しい所(冷暗所)に立てて保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わってしまうことがあります。)
- (4) 火気に近づけないでください。
- (5) 時計、めがね等の金属類、化学繊維の衣類、プラスチック類、塗装のしたある床・家具等に付着すると変質することがありますので、付着しないように注意してください。
- (6) 衣類に付着した場合には、なるべく早く水又は洗剤で洗ってください。
- (7) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

発売元 久光製薬株式会社
〒841-0017 鳥栖市田代大官町408

久光製薬お客様相談室：
0120-133250

〒100-6221
東京都千代田区丸の内1-11-1
受付時間：
9:00～12:00、13:00～17:50
(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度のお問い合わせ先
(独) 医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
0120-149-931

製造販売元
ジャパンメディック株式会社
〒931-8412 富山県富山市横越168

4 987188 155059
2808HJ

Hisamitsu

心地よいサロンパスの刺激が
コリをほぐす

肩こり・筋肉痛に

サロンパス®
ローション 85mL

第3類医薬品



効能・効果

肩こり、腰痛、関節痛、筋肉疲労、
筋肉痛、打撲、捻挫、骨折痛、しもやけ

用法・用量

1日数回、適量を患部に塗布してください。

＜用法・用量に関連する注意＞

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には眼科医の診察を受けてください。
- (4) 本剤のついた手で、目など粘膜にふれないでください。
- (5) 外用にのみ使用してください。
- (6) 入浴前後の使用は避けてください。
- (7) 入浴等で肌をこすったり、夏場など汗をかいた時は、本剤による刺激を強く感じる場合があります。激しい痛みや刺激感やかゆみを感じた場合には、使用を中止し、石けんをよく泡立て、こすらないでやさしくなでるように患部を数回水で洗った後、患部を冷水や軽くしぼったぬれタオルなどで十分に冷やしてください。症状の改善がみられない場合は、この箱を持って医師に相談してください。
- (8) 塗布した患部をコタツや電気毛布で温めないでください。
- (9) 皮膚の弱い人は、同じところに続けて塗布しないでください。
- (10) 本剤を塗った後の患部を通気性の悪いものでおおわないでください。
- (11) スポンジに薬液を十分しみこませてから患部に塗布してください。薬液をスポンジ面ににじませないで使用する、スポンジが破損する場合があります。

