

※2021年2月改訂

使用前にこの説明書を必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう保管してください。

販売名:ロートクール40α 第3類医薬品 目薬 抗ヒスタミン作用をもつクロルフェニラミン
マレイン酸塩配合で、目のかゆみを抑えます。

⚠️ 使用上の注意



相談すること

1.次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。(1)医師の治療を受けている人(2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人(3)次の症状のある人…はげしい目の痛み(4)次の診断を受けた人…緑内障
2.使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持

て医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ、しみて痛い

3.次の場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。(1)目のかすみが改善されない場合(2)2週間位使用しても症状がよくならない場合

用法・用量 1回2～3滴、1日5～6回点眼する。

●**用法・用量に関連する注意**(1)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。(2)容器の先を目やまぶた、まつ毛に触れさせないこと。[汚染や異物混入(目やにやほこり等)の原因となる]また、混濁したものは使用しないこと。(3)ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないこと。(4)点眼用にのみ使用すること。

効能・効果 目のかすみ(目やにの多いときなど)、目の疲れ、結膜充血、眼病予防(水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど)、眼瞼炎(まぶたのただれ)、目のかゆみ、紫外線その他の光線による眼炎(雪目など)、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感

成分 ※ 酢酸d-α-トコフェロール0.05%、ビタミンB₆0.1%、コンドロイチン硫酸エステルナトリウム0.1%、L-アスパラギン酸カリウム1%、ネオスチグミンメチル硫酸塩 0.005%、クロルフェニラミンマレイン酸塩0.03% ※添加物として、ホウ酸、ホウ砂、ℓ-メントール、d-ボルネオール、ユーカリ油、エデト酸Na、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、pH調節剤を含有する。

保管及び取扱い上の注意 (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管すること。品質を保持するため、自動車内や暖房器具の近くなど高温の場所(40℃以上)に放置しないこと。(2)小児の手の届かない所に保管すること。(3)他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる)(4)他の人と共用しないこと。(5)使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は使用しないこと。なお、使用期限内であっても一度開封した後は、なるべく早く使用すること。(6)保存の状態によっては、水滴や成分の結晶が容器の先やキャップの内側につくことがある。その場合には清潔なガーゼ等で軽くふきとって使用すること。(7)容器に他の物を入れて使用しないこと。

お問い合わせ先:お客さま安心サポートデスク

東京:03-5442-6020 大阪:06-6758-1230

受付時間9:00～18:00(土、日、祝日を除く)

ROHTO

ロート製薬株式会社 大阪市生野区巽西1-8-1