

第2類医薬品

使用に際しては、この説明文書を必ずお読みください。
必要なときに読めるように、大切に保管してください。

アイエース V クール (点眼薬)

長時間のテレビやパソコン、車の運転や細かい作業などによって、現代人は目を酷使してしまいがちです。

アイエース V クールは、ピント調節機能に作用して、目の疲れを改善するネオスチグミンメチル硫酸塩、血流を改善することにより、目の組織に栄養を運ぶ酢酸d- α -トコフェロール(天然型ビタミンE)、目の充血をおさえるナファゾリン塩酸塩などを配合した、クールな爽快感のある目薬です。“目の疲れ”、“目の充血”などの症状の緩和や“眼病予防”にお使いいただけます。

使用上の注意



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (3) 次の症状のある人。
はげしい目の痛み
- (4) 次の診断を受けた人。
緑内障

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ、しみて痛い

3. 次の場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

- (1) 目のかすみ改善されない場合。
- (2) 5～6日間使用しても症状がよくなる場合。

効能・効果

目の疲れ、眼病予防(水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど)、結膜充血、目のかすみ(目やにの多いときなど)、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感、紫外線その他の光線による眼炎(雪目など)、眼瞼炎(まぶたのただれ)、目のかゆみ

用法・用量

1回1～3滴、1日3～6回点眼してください。

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 過度に使用すると、異常なまぶしさを感じたり、かえって充血を招くことがあります。
- (3) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。

- (4)容器の先を目やまぶた、まつ毛に触れさせないでください。〔汚染や異物混入(目やにやホコリなど)の原因となる〕また、混濁したものは使用しないでください。
- (5)ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。
- (6)点眼用にのみ使用してください。

成分・分量

成 分	分 量	はたらき
ネオスチグミンメチル硫酸塩	0.005%	ピント調節機能に作用して、目の疲れを改善します。
酢酸d-α-トコフェロール (天然型ビタミンE)	0.05%	血流を改善することにより、目の組織に栄養を運び、目の疲れを改善します。
ナファゾリン塩酸塩	0.003%	血管を収縮させて、目の充血をおさえます。
Ｌ-アスパラギン酸カリウム	1.0%	目の細胞の呼吸を盛んにして、疲れた目の機能を改善させます。
アラントイン	0.3%	抗炎症作用により、眼病を予防します。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	0.02%	抗ヒスタミン作用により、目のかゆみや充血をおさえます。

添加物：ホウ酸、ホウ砂、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、l-メントール、d-カンフル、ベンザルコニウム塩化物、エデト酸Na、pH調節剤

保管および取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。品質を保持するため、自動車内や暖房器具の近くなど、高温の場所(40℃以上)に放置しないでください。
- (2) 小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 他の人と共用しないでください。
- (5) 期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、期限内であっても一度開封した後は、なるべく早く使用してください。
- (6) 保存の状態によっては、成分の結晶が容器の先やキャップの内側につくことがあります。その場合には清潔なガーゼなどで軽くふきとって使用してください。
- (7) 容器に他のものを入れて使用しないでください。

お問い合わせは
常盤薬品工業株式会社
お客さま相談室 ☎0120-875-710まで
受付時間 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)
www.kusuribako.jp

副作用被害救済制度のお問い合わせ先
(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
☎0120-149-931

発売元
常盤薬品工業株式会社
大阪市中央区安土町3-5-12
NOEVIR GROUP

製造販売元
O-ト製薬株式会社
大阪市生野区巽西1-8-1

ROT9101