

使用前にこの説明書を必ずお読み下さい。また、必要な時に読めるよう保管して下さい。

目薬

パソコン、ワープロ、テレビゲーム…
などによる目の疲れ・充血に

活性型ビタミンB₂(FAD・Na)配合

ロートOA目薬




パソコン、ワープロ、テレビゲーム…。仕事や気分転換に不可欠でありながら、目の疲れや充血の原因になっています。「白い壁がオレンジ色に見える」、「文字がぼやけて見える」などの症状があらわれたら、明暗順応や調節機能が低下し、目が疲れてきたサインかもしれません。

ロートOA目薬は、活性型ビタミンB₂(FAD・Na)配合。OA作業による目の疲れ、充血などの不快症状を取り除きます。


「ちょっとひと休み」という時には、**ロートOA目薬**で目も休養させてください。

特 長

●3種の成分の効果的な組み合わせで、目の疲れをすっきり取り除きます。



●目の充血、炎症をしずめます。



※ロートOA目薬の黄色い液色は、FAD・Na(活性型ビタミンB₂)によるものです。

△使用上の注意

相談すること



1. 次の人は、使用前に医師又は薬剤師にご相談下さい。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人
 - (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (4) 次の症状のある人
はげしい目の痛み
 - (5) 次の診断を受けた人
緑内障
2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師にご相談下さい。
 - (1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ

- (2) 目のかすみ改善されない場合
- (3) 5～6日間使用しても症状がよくなりえない場合

効 能

目の疲れ、紫外線その他の光線による眼炎(雪目など)、結膜充血、眼瞼炎(まぶたのただれ)、目のかすみ(目やにの多いときなど)、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感、眼病予防(水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど)、目のかゆみ

用法・用量

1 回1～2滴、1日4～5回点眼して下さい。

(用法・用量に関連する注意)

- (1)過度に使用すると、異常なまぶしさを感じたり、かえって充血を招くことがあるので用法・用量を厳守して下さい。
- (2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用して下さい。
- (3)容器の先をまぶた、まつ毛に触れさせないでください。
〔汚染や異物混入(目やにやホコリ等)の原因となる〕
また、混濁したものは使用しないで下さい。
- (4)ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないで下さい。
- (5)点眼用에만使用して下さい。




成分・分量

有効成分	配合量	有効成分	配合量
フラビンアデニンジスクレオチドナトリウム (FAD・Na)	0.033%	L-アスパラギン酸カリウム	1.000%
メチル硫酸ネオスチグミン	0.005%	塩酸ナファゾリン	0.003%
マレイン酸クロロフェニラミン	0.020%		

添加物として、ホウ酸、ℓ-メントール、ユーカリ油、ゲラニオール、塩化ベンザルコニウム、クロロブタノール、エデト酸Na、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、エタノールを含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管して下さい。
品質を保持するため、自動車内や暖房器具の近くなど、高温の場所(40℃以上)に放置しないで下さい。
- (2)小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3)他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わる)
- (4)他の人と共用しないで下さい。
- (5)使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は使用しないで下さい。
なお、使用期限内であっても一度開封した後は、なるべく早くご使用下さい。
- (6)保存の状態によっては、成分の結晶が容器の先やキャップの内側につくことがあります。その場合には清潔なガーゼで軽くふきとってご使用下さい。
- (7)容器に他の物を入れて使用しないで下さい。



※薬剤の黄色は衣服についた場合、多少落ちにくいかもしれません。あらかじめご注意下さい。

お問い合わせ先:お客さま安心サポートデスク

この商品をお使いになっているのご意見・ご要望、またご不満な点などをお聞かせいただけますか。[あなたに伝えたい]サポートデスクです。

東京:03-5442-6020 大阪:06-6758-1230

受付時間 9:00～18:00(土、日、祝日を除く)