

使用前にこの説明書を必ずお読みください。
また、必要なときに読めるよう保管してください。

目のかすみ・目の疲れに

新 ロートV40

眼科薬

15mL

使用上の注意

相談すること



1 次の人は、使用前に医師又は薬剤師 にご相談ください。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人
- (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (4) 次の症状のある人
はげしい目の痛み
- (5) 次の診断を受けた人
緑内障

2 次の場合は、直ちに使用を中止し、 この説明書を持って医師又は薬剤師 にご相談ください。

- (1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ

- (2) 目のかすみ改善されない場合

- (3) 2週間位使用しても症状がよく
ならない場合

効能・効果

- 目のかすみ(目やにの多いときなど)
- 目の疲れ
- 結膜充血
- 眼病予防(水泳のあと、
ほこりや汗が目に入
ったときなど)
- 眼瞼炎(まぶたのただれ)
- 目のかゆみ
- 紫外線その他の光線による眼炎
(雪目など)
- ハードコンタクトレンズを
装着しているときの不快感



用法・用量

1回2～3滴、1日5～6回点眼してください。

用法・用量に関連する注意

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに
使用させてください。
- (2) 容器の先をまぶた、まつ毛に触れさせないでください。
〔汚染や異物混入(目やにやホコリ等)の原因となる〕
また、混濁したものは使用しないでください。
- (3) ソフトコンタクトレンズを装着したまま
使用しないでください。
- (4) 点眼用にのみ使用してください。



有効成分

目の疲れを改善するために…

メチル硫酸ネオスチグミン

0.005%

ピント調節筋（毛様体筋）の調節機能改善を促し、目の疲れを癒します。

塩酸ピリドキシン（ビタミンB₆）

0.1%

目に栄養を補給することで目の細胞の新陳代謝を活発にし、疲れ目を改善します。

アミノエチルスルホン酸（タウリン）

1.0%

角膜の新陳代謝を促進し、疲れ目を改善します。

L-アスパラギン酸カリウム

1.0%

目の細胞呼吸を促進し、目の疲れを癒します。

酢酸d- α -トコフェロール（天然型ビタミンE）

0.05%

血行を促進して栄養を送り届け、疲れ目を改善します。

目のかゆみを抑えるために…

マレイン酸クロルフェニラミン



0.03%

抗ヒスタミン剤のひとつで、目のかゆみをきちんと鎮めます。

添加物として、ホウ酸、ホウ砂、*l*-メントール、*d*-ボルネオール、ユーカリ油、クロロブタノール、塩化ベンザルコニウム、エデト酸Na、エタノール、ポリソルベート80を含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。品質を保持するため、自動車内や暖房器具の近くなど、高温の場所（40℃以上）に放置しないでください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わる）
- (4) 他の人と共用しないでください。
- (5) 使用期限（外箱に記載）を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても一度開封した後は、なるべく早くご使用ください。
- (6) 保存の状態によっては、成分の結晶が容器の先やキャップの内側につくことがあります。その場合には清潔なガーゼで軽くふきとってご使用ください。
- (7) 容器に他の物を入れて使用しないでください。



お問い合わせ先：お客さま安心サポートデスク

この商品をお使いになってのご意見・ご要望、またご不満な点などをお聞かせいただけませんか。「あなたに伝えたい」サポートデスクです。

東京:03-5442-6020 大阪:06-6758-1230

受付時間 9:00～18:00（土、日、祝日を除く）