

ご使用に際しては、この説明書を必ずお読みください。また、必要ときに読めるよう大切に保管してください。

【効 能】

かゆみを伴う乾燥性皮膚（老人・成人の乾皮症）

【用 法】

1日1～数回、適量を患部に塗布してください

(1)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください

(2)小児（15歳未満）には使用させないでください

(3)外用にのみ使用してください

【成 分】100g中

尿 素……………20g
リドカイン……………2g
ジフェニヒドラミン……………1g
グリチルレチン酸……………0.3g
トコフェロール酢酸エステル……………0.5g
添加物：DL-アラニン、グリシン、クエン酸Na水和物、乳酸、乳酸Na、エドト酸Na水和物、セタノール、ステアリン酸ポリオキシシル、パラベン、ミリスチン酸イソプロピル、カルボキシビニルポリマー、β-メントール、香料

【保管および取扱い上の注意】

(1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください(2)小児の手の届かない所に保管してください(3)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)(4)キャップの開め方が不十分な場合、乳液が乾燥し、ザラザラ感がでることがありますので、ご使用のつどキャップをきちんと閉めてください(5)表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないでください

製造
番号

使用
期限

ナティーム20DX (ローション)

かゆみ止め成分配合 20%尿素 乳液

かゆみを伴う
乾燥性皮膚の治療に

尿素20%
保湿成分

リドカイン
かゆみ止め成分

ジフェニヒドラミン
かゆみ止め成分

【使用上の注意】

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の人は使用しないでください

(1)本剤または本剤の成分により過敏症状（発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等）を起こしたことがある人

2. 次の部位には使用しないでください

(1)目のまわり、粘膜等(2)引っかけ傷等の傷口、亀裂（ひび割れ）部位(3)かさぶたのように皮ふがはがれている所(4)炎症部位（ただれ・赤くはれている所）

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください

(1)医師の治療を受けている人(2)薬などによりアレルギー症状（発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等）を起こしたことがある人

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、刺激感（痛み、熱感、ヒリビリ感）、はれ、かさぶたのように皮ふがはがれる状態

3. 2週間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください

発売元
ラケール薬品販売株式会社
東京都足立区鹿浜1丁目9番14号

◆お問い合わせ先◆
フリーダイヤル 0120-86-8998

製造販売元
三友薬品株式会社
東京都足立区鹿浜1丁目9番14号

副作用被害救済制度の問合せ先
（独）医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話 0120-149-931（フリーダイヤル）

ここから
開けてください

こんな症状に効果的です

- お風呂上がりで血行が良くなるとかゆくなる
- 寒さが増し空気が乾燥してくるとかゆくなる
- 衣類の刺激などでかゆくなる

5つの成分が配合されています

尿素20%
うるおい
保湿成分

リドカイン
かゆみ止め
成分

ジフェニヒドラミン
かゆみ止め
成分

水分をとりこみ
皮ふを柔らかくします

局所麻酔剤と抗ヒスタミン剤が
Wでかゆみを抑えます

グリチル
レチン酸
消炎成分

トコフェロール
酢酸エステル
血行促進
成分

皮ふの炎症を
鎮めます

皮ふの新陳代謝を
高めます

皮膚がわらか成分（尿素）などが
うるおいのあるお肌になります

2種類のかゆみ止め成分が
乾燥肌によるかゆみを鎮めます