

# ナディール20DX クリーム

かゆみ止め成分配合  
**20%尿素**  
クリーム

乾燥性皮膚の治療に  
かゆみを伴う



尿素20%  
保湿成分

リドカイン  
かゆみ止め成分

ジフェンヒドラミン  
かゆみ止め成分

皮膚やわらか成分(尿素)などが  
うるおいのあるお肌にします

2種類のかゆみ止め成分が  
乾燥肌によるかゆみを鎮めます



## 【保管および取扱い上の注意】

(1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください  
(2)小児の手の届かない所に保管してください(3)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)  
(4)キャップの閉め方が不十分な場合、クリームが乾燥し、ザラザラ感がでることがありますので、ご使用のつどキャップをきちんと閉めてください  
(5)表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないでください

製造  
番号  
使用  
期限

発売元  
ラクール薬品販売株式会社  
東京都足立区鹿浜1丁目9番14号

◆お問い合わせ先◆  
フリーダイヤル 0120-86-8998

製造販売元  
三友薬品株式会社  
東京都足立区鹿浜1丁目9番14号

## 5つの成分が配合されています

尿素20%  
うるおい  
保湿成分

水分をとりこみ  
皮ふを柔らかくします

リドカイン  
かゆみ止め  
成分

局所麻酔剤と抗ヒスタミン剤が  
Wでかゆみを抑えます

ジフェンヒドラミン  
かゆみ止め  
成分

グリチル  
レチン酸  
消炎成分

皮ふの炎症を  
鎮めます

トコフェロール  
酢酸エステル  
血行促進  
成分

皮ふの新陳代謝を  
高めます

【効 能】 かゆみを伴う乾燥性皮膚(老人・成人の乾皮症)

【用 法】 1日1～数回、適量を患部に塗擦してください

(1)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください(2)小児(15歳未満)には使用させないでください(3)外用にのみ使用してください

【成 分】100g中 尿素…20g、リドカイン…2g、ジフェンヒドラミン…1g、グリチルレチン酸…0.3g、トコフェロール酢酸エステル…0.5g 添加物: DL-アラニン、グリシン、クエン酸Na水和物、乳酸、乳酸Na、エデト酸Na水和物、セタノール、ステアリン酸ポリオキシル、パラベン、ミリスチン酸イソプロピル、カルボキシビニルポリマー、ℓ-メントール、香料

副作用被害救済制度の問合せ先  
(独)医薬品医療機器総合機構  
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>  
電話 0120-149-931(フリーダイヤル)



ご使用に際し、この説明文書を必ずお読みください。

## 【使用上の注意】

### してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

#### 1. 次の人は使用しないでください

(1)本剤または本剤の成分により過敏症状(発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人

#### 2. 次の部位には使用しないでください

(1)目のまわり、粘膜等(2)引っかき傷等の傷口、亀裂(ひび割れ)部位(3)かさぶたのように皮ふがはがれている所(4)炎症部位(ただれ・赤くはれている所)

### 相談すること

#### 1. 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください

(1)医師の治療を受けている人(2)薬などによりアレルギー症状(発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください

| 関係部位 | 症 状                                             |
|------|-------------------------------------------------|
| 皮 膚  | 発疹・発赤、かゆみ、刺激感(痛み、熱感、ピリピリ感)、はれ、かさぶたのように皮ふがはがれる状態 |

3. 2週間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください