

使用前にこの説明書を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう保管してください。第1類医薬品

花粉症・ハウスダストなどの鼻のアレルギー症状や、じんましんなどの皮膚の症状にアレルギー用薬

医療用成分 エメダスチンフマル酸塩 配合

アルガード® 抗アレルギーカプセル

アルガード抗アレルギーカプセルは医療用成分エメダスチンフマル酸塩を配合した、アレルギーによる鼻炎や皮膚の症状の改善薬です。

花粉などの季節性アレルギーによる鼻炎などの症状に使用する場合は、**シーズン初期の症状が比較的軽いうちから飲み始め、シーズン中はしっかり服用する**※ことでピーク時期のその症状の悪化にも対処します。※用法・用量をお守りください。



使用上の注意

してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

- 1** 次の人は服用しないでください。

(1) 本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。

(2) 15才未満の小児。
- 2** 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください。

他のアレルギー用薬(皮膚疾患用薬、鼻炎用内服薬を含む)、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬(かぜ薬、鎮咳去痰薬、乗物酔い薬、催眠鎮静薬)
- 3** 服用時は飲酒しないでください。
- 4** 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。(眠気があらわれることがあります)
- 5** 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。(動物試験で乳汁中への移行が認められています)
- 6** 長期連用しないでください。

相談すること



- 1** 次の人は服用前に医師又は薬剤師にご相談ください。

(1) 医師の治療を受けている人。

(2) 肝障害又はその既往歴のある人。

(3) 妊婦又は妊娠していると思われる人。

(4) 高齢者。

(5) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

(6) アトピー性皮膚炎、又はアトピー素因があると診断を受けた人。
- (7) 気管支ぜんそくの診断を受けた人。

(8) 鼻炎の場合でアレルギー性鼻炎か、かぜによる鼻炎かわからない人。又は、皮膚の症状が「じんましん、湿疹・かぶれ」によるものか虫さされや化膿等他の原因によるものかわからない人。



- 2** 次の場合は直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師にご相談ください。

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	腹痛、悪心・嘔吐、食欲不振、胃部不快感、胃もたれ感、腹部膨満感
精神神経系	舌のしびれ、一過性健忘、倦怠・脱力感、頭痛・頭重感、頭がボーッとする、ふらつき、しびれ感、耳鳴、こぼり
循環器	動悸、血圧上昇
目	目のしょぼしょぼ感、眼痛
肝臓	黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)
その他	血尿、頻尿、尿量減少、息苦しさ、月経異常、胸痛、ほてり、浮腫、苦味、鼻乾燥

(2) 鼻炎の症状に用いる場合は**1週間**、皮膚の症状に用いる場合は**3日間**服用しても症状の改善がみられない場合

- 3** 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師にご相談ください。 口のかわき、便秘、下痢、**眠気**

- ④ 鼻炎の症状の場合で2週間以上服用する場合、医師又は薬剤師にご相談ください。
- ⑤ じんましん、湿疹・かぶれなどの皮膚の症状の場合で、症状の軽減がみられるが繰り返し症状が起こるなど1週間以上症状が継続する場合は、医師又は薬剤師にご相談ください。

成分・分量（1日量：2カプセル中）

エメダスチンフマル酸塩…… 2mg

添加物として、トウモロコシデンプン、白糖、ヒドロキシプロピルセルロース、エチルセルロース、ステアリン酸Mg、ゼラチン、ラウリル硫酸Naを含有します。

用法・用量


次の量を水又はお湯で服用してください。

年 齢	1回量	1日服用回数
成人（15才以上）	1カプセル	2回（朝食後・就寝前）
15才未満	服用しないこと	

ただし、鼻炎の症状に用いる場合は**1週間**、皮膚の症状に用いる場合は**3日間**服用しても症状の改善がみられない場合には服用を中止し、医師又は薬剤師にご相談ください。

■用法・用量に関連する注意

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) カプセルの取り出し方
図のようにカプセルのはいつているPTPシートの凸部を指先で強く押して裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用してください。（誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります。）



効能・効果

■花粉、ハウスダスト（室内塵）などによる次のような

鼻のアレルギー症状の緩和：くしゃみ、鼻みず、鼻づまり

■じんましん、湿疹・かぶれによる次の症状の緩和：皮膚のはれ、かゆみ

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
（誤用の原因になったり品質が変わることがあります。）
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。
なお、使用期限内であっても一度内袋を開封した後は、なるべく早くご使用ください。



お問い合わせ先；お客さま安心サポートデスク

この商品をお使いになってのご意見・ご要望、またご不満な点などをお聞かせいただけませんか。「あなたに伝えたい」サポートデスクです。

東京：03-5442-6020 大阪：06-6758-1230

受付時間 9:00～18:00（土、日、祝日を除く）

ROHTO ロート製薬株式会社
大阪市生野区巽西1-8-1