

ご使用前にこの説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう保管してください。

痔 疾 用 薬

ザッスルエース坐剤

第②類医薬品

- 痔疾患は、静脈のうっ血が原因となって、炎症、痛み、かゆみ、出血を引き起こし、さらに肛門部の抵抗力が低下すると、腸内細菌や化膿菌等の感染によって症状が悪化して、複雑な痔となってしまいます。このような痔疾患の治療には、まず局所の炎症を鎮め、痛みや出血の原因を早めに正しい方法で取り去ることが大切です。
- ザッスルエース坐剤は、痔に効果のある薬剤を肛門内のどの患部へも的確に届けることができるので、激しい痔の痛み・かゆみ・出血等の諸症状にも、より確実に、速く、優れた効果をあらわします。



使用上の注意



してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる）

1. 次の人は使用しないこと

- (1) 本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2) 患部が化膿している人。

2. 長期連用しないこと



相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (4) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること

(1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ
その他	刺激感、化膿

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさ等があらわれる。

(2) 10日間位使用しても症状がよくならない場合

【効能・効果】

きれ痔（さけ痔）・いぼ痔の痛み・かゆみ・はれ・出血の緩和

【用法・用量】


次の量を肛門内に挿入してください。

年 令	1回量	1日使用回数
成人（15歳以上）	1個	3回まで
15歳未満	使用しないこと	

＜用法及び用量に関する注意＞

- (1) 小児には使用させないこと。
- (2) 本剤が軟らかい場合には、しばらく冷やした後使用すること。また、硬すぎる場合には、軟らかくなった後に使用すること。
- (3) 肛門にのみ使用すること。
- (4) 定められた用法・用量を守ること。

坐剤のとり出し方



【成分・分量】（1個中）

成 分	含 量	は た ら き
リドカイン	60mg	痔の痛みとかゆみをおさえます。
ヒドロコルチゾン酢酸エステル	5mg	痔のはれと出血をおさえます。
酸化亜鉛	80mg	患部を保護し、炎症をおさえます。
イソプロピルメチルフェノール	2mg	患部の殺菌消毒をおこないます。
クロロフェニラミンマレイン酸塩	4mg	痔の炎症とかゆみをおさえます。
アラントイン	20mg	痔の炎症をおさえ、傷口の回復を早めます。
トコフェロール酢酸エステル	60mg	血流を良くし、うっ血をおさえます。

添加物：ハードファット、ハッカ油

保管及び取り扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所（30℃以下）に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）
- (4) 坐剤の先端を下向きにして保管すること。（軟化しても坐剤の変形を防ぐことができる。）
- (5) 使用期限（外箱に記載）を過ぎた製品は使用しないこと。また開封後は使用期限内であってもなるべく速やかに使用すること。

【だれにでもかんたんにできる痔の養生法】

- (1) 散歩や軽い体操など適度な運動を行うと、全身の血液の流れを良くしますので、痔によるうっ血改善に効果をもたらします。
- (2) 毎日の入浴は、患部を清潔にするだけでなく、全身の血液の流れも良くしますので、痔によるうっ血改善に効果をもたらします。ややぬるめのお湯にゆっくりとつかってください。
- (3) お酒、タバコやからし等の刺激物は、痔の大敵のうっ血をおこしますので、できるだけ控えるように気をつけてください。
- (4) 便秘になると痔を悪化させてしまいます。肉類を控えて、野菜や果物をたっぷり食べて便秘にならないように気をつけてください。

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願いいたします。

中外医薬生産株式会社 お客様相談室

電話 0595-21-3200

受付時間 9：00～17：00（土・日・祝祭日を除く）



製造販売元

中外医薬生産株式会社

三重県伊賀市ゆめが丘7-5-5