

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。
また必要な時に読めるよう大切に保存してください。

胃腸薬

第2類医薬品

熊 膽 圓 S



使用上の注意



してはいけないこと

〔守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる〕
授乳中の人には本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください



相談すること

- 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください
 - 医師の治療を受けている人
 - 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）
 - 胃腸が弱く下痢しやすい人
 - 次の場合は、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師又は薬剤師に相談してください
 - 服用後、次の症状があらわれた場合
- | 関係部位 | 症 状 |
|------|----------------|
| 消化器 | はげしい腹痛を伴う下痢、腹痛 |
- 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合
- 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください
下痢

【効能・効果】

食欲不振（食欲減退）、胃部・腹部膨満感、消化不良、胃弱、食べ過ぎ（過食）、飲み過ぎ（過飲）、胸やけ、もたれ（胃もたれ）、胸つかえ、はきけ（むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心）、嘔吐、整腸（便通を整える）、軟便、便秘


【用法・用量】

次の量を食間に、水又は白湯にて服用してください。

年 齢	1 回 量	1 日 服 用 回 数
成人（15歳以上）	1 個	3 回
11歳以上15歳未満	2/3 個	3 回
11歳未満	服用しないでください	

〈用法・用量に関連する注意〉

- 用法・用量を厳守してください。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- 熊膽圓Sの取り出し方
右図のように熊膽圓Sの入っているアルミ箔（バイナライト）を指先で裂き、取り出してください。



【成分・分量】

1日量（3個）中

（1包：1個入）

成 分 (原生薬)	分 量 (原生薬換算量)
オウレンエキス (オウレン)	11.2mg (70mgに相当)
オウバクエキス (オウバク)	49.4mg (380mgに相当)
センブリエキス (センブリ)	14mg (70mgに相当)
ゲンチアナエキス (ゲンチアナ)	62mg (200mgに相当)
ダイオウエキス (ダイオウ)	40mg (200mgに相当)
ウコンエキス (ウコン)	28mg (350mgに相当)
アロエ	150mg
動物胆（牛胆）	50mg
アカメガシワエキス (アカメガシワ)	275mg (2500mgに相当)

添加物として、デキストリン、タルクを含有する。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)1包を分割した残りを使用する場合には、袋の口を折り返して保管し、
2日以内に使用してください。
- (5)配置期限又は使用期限の過ぎた製品は使用しないでください。

■お問い合わせ先本品に関するお問い合わせは、お買い求め先、または下記に
お願い申し上げます。

株式会社 廣貫堂 「お客様相談窓口」

電話番号：076-424-2259

受付時間：9時から17時まで（土・日・祝祭日を除く）

製造販売元

**株式会社 廣 貫 堂**

〒930-0055 富山市梅沢町2丁目9-1

副作用被害救済制度の問い合わせ先

(独) 医薬品医療機器総合機構

<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>

電話 0120-149-931（フリーダイヤル）