

2012年10月改訂
(記載要領変更に伴う改訂)

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。
また必要な時に読めるよう大切に保存してください。

胃腸薬

第2類医薬品

熊 膽 圓 S



使用上の注意



してはいけないこと

〔守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります〕
授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1)医師の治療を受けている人。
(2)体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）。
(3)胃腸が弱く下痢しやすい人。

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
消化器	はげしい腹痛を伴う下痢、腹痛

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

下痢

4. 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【効能・効果】

食欲不振（食欲減退）、胃部・腹部膨満感、消化不良、胃弱、食べ過ぎ（過食）、飲み過ぎ（過飲）、胸やけ、もたれ（胃もたれ）、胸つかえ、はきけ（むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心）、嘔吐、整腸（便通を整える）、軟便、便秘


【用法・用量】

次の量を食間に、水又は白湯にて服用してください。

年 齢	1回量	1日服用回数
成人（15歳以上）	1個	3回
11歳以上15歳未満	2/3個	
11歳未満	服用しないでください	

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3)熊膽圓Sの取り出し方
右図のように熊膽圓Sの入っているアルミ箔（バイナライト）を指先で裂き、取り出してください。



成人1回量（1個）

11歳以上15歳未満は2/3個に割って服用ください。

裏面もよくお読みください。

【成分・分量】

1日量（3個）中

（1包：1個入）

成 分	分 量
オウレンエキス	11.2mg （オウレン70mgに相当）
オウバクエキス	49.4mg （オウバク380mgに相当）
センブリエキス	14mg （センブリ70mgに相当）
ゲンチアナエキス	62mg （ゲンチアナ200mgに相当）
ダイオウエキス	40mg （ダイオウ200mgに相当）
ウコンエキス	28mg （ウコン350mgに相当）
アロエ	150mg
動物胆（牛胆）	50mg
アカメガシワエキス	275mg （アカメガシワ2500mgに相当）

添加物として、デキストリン、タルクを含有する。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。
（誤用の原因になったり品質が変わります。）
- (4)1包を分割した残りを使用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に使用してください。
- (5)使用期限の過ぎた製品は使用しないでください。

■お問い合わせ先

本品に関するお問い合わせは、お買い求め先、または下記に
お願い申し上げます。

株式会社 廣貫堂 「お客様相談窓口」

電話番号：076-424-2259

受付時間：9時から17時まで（土・日・祝祭日を除く）

製造販売元



株式会社 廣 貫 堂

〒930-0055 富山市梅沢町2丁目9-1

副作用被害救済制度の問い合わせ先

（独）医薬品医療機器総合機構

<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>

電話 0120-149-931（フリーダイヤル）