

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管しておいてください。

## 第2類医薬品

総合かぜ薬

小柴胡湯エキス・ビタミンC配合

# ビスティー<sup>®</sup>SC

かぜは身近な病気であるだけに軽く考えられがちですが、こじらせたり、長びかせたりしないよう早めに適切な治療をすることが大切です。

ビスティーSCは、かぜの不快感を緩和することが知られている小柴胡湯エキスに、かぜの諸症状に効果をあらわす非ピリン系の解熱鎮痛剤、鎮咳剤、抗ヒスタミン剤などと、かぜの発熱などで失われがちなビタミンCを配合した総合かぜ薬です。

### △ 使用上の注意

#### ⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないでください

- (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2) 本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。

2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください

他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)

3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください

(眠気等があらわれることがあります。)

4. 服用前後は飲酒しないでください

5. 長期連用しないでください

#### ⊗ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (4) 次の症状のある人。

高熱、排尿困難

(5) 次の診断を受けた人。

心臓病、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障

(6) インターフェロン製剤で治療を受けている人。

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
泌尿器	排尿困難、頻尿、排尿痛、血尿、残尿感
その他	過度の体温低下

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。

その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブスジョンソン症候群)、 中毒性表皮壊死融解症、 急性汎発性発疹性膿疱症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ(小膿疱)が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
腎障害	発熱、発疹、尿量の減少、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛(節々が痛む)、下痢等があらわれる。
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
ぜんそく	息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。

(裏面へ続く)

- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
口のかわき、眠気
- 5～6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

### <効能・効果>

かぜの諸症状（鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み）の緩和

### <用法・用量>

次の1回量を1日3回、食後なるべく30分以内に服用してください。

1回量	15才以上	7才以上15才未満	7才未満
	2カプセル  	1カプセル 	服用しないこと ×

### 用法・用量に関連する注意

- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- 定められた用法・用量を厳守してください。
- カプセルの取り出し方は右図のようにカプセルの入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して裏面のアルミ箔を破り、取り出してから服用してください。  
(誤ってそのまま飲み込んだりすると、食道粘膜に突きささる等思わぬ事故につながります。)

（PTPシートの取り出し図）



### <成分・分量>

6カプセル中に次の成分・分量を含んでいます。

成分	分量	作用
小柴胡湯エキス末 (原生薬換算量6.4g) サイコ 1.9g ハンゲ 1.3g オウゴン 0.8g タイソウ 0.8g ニンジン 0.8g カンゾウ 0.5g シヨウキョウ 0.3g	528.9mg	かぜの後期の症状に効果をあらわします。
アセトアミノフェン	900mg	熱を下げ、頭痛、のどの痛み、関節の痛みをやわらげます。
d-クロルフェニラミンマレイン酸塩	3.5mg	くしゃみ、鼻水、鼻づまりの症状をおさえます。
チベジジンヒベンズ酸塩	75mg	せきの中枢に作用してせきをしずめ、たんを切ります。
無水カフェイン	75mg	頭痛をしずめます。
アスコルビン酸（ビタミンC）	300mg	かぜの発熱などにより失われたビタミンCを補います。

添加物：トウモロコシデンプン、メタケイ酸アルミン酸Mg、カルメロースCa、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸Mg、軽質無水ケイ酸、ゼラチン、酸化チタン、ラウリル硫酸Na、赤色3号、黄色5号

### 保管及び取り扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。  
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または次の所にお問い合わせください。  
大昭製薬株式会社 おくすり相談室  
電話 0748-88-4181  
受付時間 9:00～17:00（土、日、祝日を除く）

発売元 京都薬品ヘルスケア株式会社  
京都市中京区西ノ京月輪町38番地

製造販売元 **大昭製薬株式会社**  
滋賀県甲賀市甲賀町大原市場168