

かぜ

の初期症状に
葛根湯液

眠くなりにくい漢方のかぜ薬

さむけ

発熱

のどの痛み

さむけ

発熱

のどの痛み

win

かぜ

眠くなりにくい
漢方のかぜ薬

の初期症状に

葛根湯液

第2類医薬品

朝1日夕

2回

45mL×2本(1日分)

かぜ

の初期症状に
葛根湯液

第2類医薬品 45mL

さむけ

発熱

のどの痛み

滋賀県製薬株式会社

かぜ

の初期症状に

葛根湯液

第2類医薬品 45mL

さむけ

発熱

のどの痛み

製造販売元
滋賀県製薬株式会社



4 974042 203131

使用期限

製造番号



08JUL150

20.9.1-

第2類医薬品

開け口

45mL×2本
(1日分)

服用前に説明書をよくお読み下さい。また、大切に保管して下さい。

葛根湯液EX2

△【使用上の注意】

❌【してはいけないこと】

(守らないと現在の症状が悪化したり副作用・事故が起こりやすくなります)
長期連用しないで下さい

★【相談すること】

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談して下さい

(1) 医師の治療を受けている人 (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
(3) 体の虚弱な人 (体力の衰えている人、体の弱い人) (4) 胃腸の弱い人
(5) 発汗傾向の著しい人 (6) 高齢者 (7) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ
等を起こしたことがある人 (8) 次の症状のある人：むくみ、排尿困難 (9) 次の診断を受けた人：高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この商品を持って医師又は薬剤師に相談して下さい

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。
肝機能障害	全身のだるさ、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)等があらわれる。

(2) 5～6回服用しても症状がよくならない場合

【効能効果】

かぜの初期の諸症状(発熱、さむけ、頭痛、肩・首筋のこわばり、鼻閉、鼻水、のどの痛み)

【保管及び取扱い上の注意】

(1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管して下さい。(2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。(3) 他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わります。)(4) 表示の期限内に服用して下さい。

【用法用量】

成人(15才以上) 1回1本、1日2回
朝夕、食前又は食間によく振って
から服用して下さい。

●【用法用量に関連する注意】

(1) 用法用量を厳守して下さい。
(2) 本品は1回に1本を飲みきり、
分割服用はしないで下さい。

【成分分量】90mL(45mL×2本)中

葛根湯エキス 4340mg

カッコン	8.0g
マオウ	4.0g
タイソウ	4.0g
ケイヒ	3.0g
シャクヤク	3.0g
カンソウ	2.0g
ショウキョウ	1.0g

添加物としてハチミツ、安息香酸
Na、パラベン、ステアリン酸ポリ
オキシル、香料を含有します。●配合成分により、沈殿を生じる
ことがあります。よく振って服用
して下さい。

■お問い合わせ先

滋賀県製薬株式会社 くすり相談室
電 話：(0748)88-3180(大代表)
受付時間：9時から17時まで
(土、日、祝日を除く)

副作用救済制度 ☎0120-149-931

製造販売元
滋賀県製薬株式会社
滋賀県甲賀市甲賀町瀬879

開封年月日

開封時に記入してください。

1A8-Ⅲ