

第2類医薬品

開け口

45mL×2本
(1日分)

服用前にこの説明書きを必ずお読み下さい。また、大切に保管して下さい。

<漢方製剤> 葛根湯液EX2

【使用上の注意】

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

- (1) 医師の治療を受けている人 (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
(3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人) (4) 胃腸の弱い人
(5) 発汗傾向の著しい人 (6) 高齢者 (7) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人 (8) 次の症状のある人: むくみ、排尿困難
(9) 次の診断を受けた人: 高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この商品(箱)を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

3. 1ヵ月位(感冒の初期、鼻かぜ、頭痛に服用する場合には5~6回)服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この商品(箱)を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

【効能効果】

体力中等度以上のものの次の諸症: 感冒の初期(汗をかいていないもの)、鼻かぜ、鼻炎、頭痛、肩こり、筋肉痛、手や肩の痛み

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管して下さい。(2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。(3) 他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わります。)(4) 表示の期限内に服用して下さい。

【用法用量】

成人(15才以上)1回1本、1日2回朝夕、食前又は食間によく振ってから服用して下さい。

● 食間とは食後2~3時間をさします。

<用法用量に関する注意>

(1)用法用量を厳守して下さい。

(2)本品は1回に1本を飲みきり、分割服用はしないで下さい。

【成分分量】 90mL(45mL×2本)中

葛根湯エキス 4340mg

カッコン 8.0g

マオウ 4.0g

タイソウ 4.0g

ケイヒ 3.0g

シャクヤク 3.0g

カンゾウ 2.0g

ショウキョウ 1.0g

添加物としてハチミツ、安息香酸Na、パラベン、ステアリン酸ポリオキシル、香料を含有します。

● 配合成分により、沈殿を生じます。よく振って服用して下さい。

● 生薬成分による沈殿物が瓶口に付着しますので、瓶を横にして保管しないで下さい。

■お問い合わせ先

滋賀県製薬株式会社 <すり相談室

電話:(0748)88-3180(大代表)

受付時間:9時から17時まで

(土、日、祝日を除く)

製造販売元



滋賀県製薬株式会社

滋賀県甲賀市甲賀町清879

副作用被害救済制度

電話:0120-149-931

開封年月日

（記入欄）

開封時に記入して下さい。