

2013年9月作成

本剤のご使用前にこの説明事項を必ずお読みください。

### 第3類医薬品

## 殺菌消毒剤

日本薬局方

# エタノール

Ethanol

500mL

**火気厳禁** 第四類アルコール類・水溶性・危険等級Ⅱ

発売元

 中北薬品株式会社  
愛知県津島市白浜町字番場52-1

製造販売元

小堺製薬株式会社  
東京都墨田区両国4-36-9

**【効能・効果】** 創傷面の殺菌・消毒

**【用法・用量】**

本品830mLを精製水でうすめて1000mLとし、これを脱脂綿、ガーゼ等に浸して軽く塗布する。

### 使用上の注意

#### ⊗ してはいけないこと

【守らないと現在の症状が悪化したり副作用が起こりやすくなります。】

1. 局所刺激作用があるため、軽く塗布するだけにとどめ、ガーゼ、脱脂綿等に浸して患部に貼付しないでください。
2. 次の部位には使用しないでください。  
目の周り、口唇等の粘膜の部分



#### ■ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。  
(1) 医師の治療を受けている人  
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人  
(3) 患部が広範囲の人  
(4) 深い傷やひどいやけどの人
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ等

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

### <用法・用量に関連する注意>

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い流してください。なお、症状が重い場合には、直ちに眼科医の診療を受けてください。
- (3) 外用にのみ使用し、内服しないでください。
- (4) 定められた用法を厳守してください。
- (5) 同一部位にくり返し使用した場合には、脱脂綿による皮ふ荒れを起こすことがありますので注意してください。
- (6) 長期間又は広範囲に使用する場合には、蒸気の吸入に注意してください。

### 【成 分】

本品はエタノール(C<sub>2</sub>H<sub>6</sub>O)95.1～96.9vol%を含みます。

### 【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光及び火気避け、なるべく涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。)
- (4) 変質、変色等を起こすおそれがあるので、適用箇所以外に本液が付着しないように注意してください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

### 【お問い合わせ先】

中北薬品株式会社 製薬工場事業部  
電話 0567-32-1431  
受付時間：9時から17時まで(土、日、祝日を除く)

### 【副作用被害救済制度のお問い合わせ先】

(独)医薬品医療機器総合機構  
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>  
電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

 キャップ：PP  
外装フィルム：PE  
ガラス：瓶

開封日

年 月 日

使用期限  
製造番号



4 987333 021130