

開け口

第1類医薬品

鎮痛消炎薬

イブアウター[®] テープ

肩こり痛

腰痛

4枚入(7cm×10cm)

4枚×1袋

医療用成分「ジクロフェナクナトリウム」とは?

「ジクロフェナクナトリウム」は痛みの原因となる物質(プロスタグランジン)の生成を抑え、肩こり痛・腰痛に優れた鎮痛効果を発揮します。

この箱(説明)は、本剤とともに保管し、ご使用の際には、必ずお読みください。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

- 次の人は使用しないでください
 - 本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - ぜんそくを起こしたことがある人。(3)妊婦又は妊娠していると思われる人。(4)15才未満の小児。
- 次の部位には使用しないでください
 - 目の周囲、粘膜等。(2)湿疹、かぶれ、傷口。(3)みずむし・たむし等又は化膿している患部。
- 本剤を使用している間は、他の外用鎮痛消炎薬を併用しないでください
- 連続して2週間以上使用しないでください

🗨 相談すること

- 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください
 - 医師の治療を受けている人。(2)他の医薬品を使用している人。(3)本人又は家族がアレルギー体質の人。(4)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。(5)テープ剤でかぶれ等を起こしたことがある人。(6)次の診断を受けた人。消化性潰瘍、血液障害、肝臓病、腎臓病、高血圧、心臓病、インフルエンザ(7)次の医薬品の投与を受けている人。ニューキノロン系抗菌剤、トリアムテレン、リチウム、メトトレキサート、非ステロイド性消炎鎮痛剤、ステロイド剤、利尿剤、シクロスポリン、選択的セロトニン再取り込み阻害剤(8)高齢者。
- 次の場合は、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師又は薬剤師に相談してください
 - 使用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、はれ、皮膚のあれ、刺激感、色素沈着、水疱、落屑(皮膚片の細かい脱落)

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
接触皮膚炎、光線過敏症	貼付部に強いかゆみを伴う発疹・発赤、はれ、刺激感、水疱・ただれ等の激しい皮膚炎症状や色素沈着、白斑があらわれ、中には発疹・発赤、かゆみ等の症状が全身に広がることもある。また日光が当たった部位に症状があらわれたり、悪化することがある。

(2)5~6日間使用しても症状がよくなる場合。

本剤のご使用により、変わった症状があらわれた場合は、エスエス製薬(株) お客様相談室までご連絡をお願いします。

【お問い合わせ先】お買い求めのお店、又はお客様相談室にお問い合わせください。

エスエス製薬株式会社 お客様相談室

☎0120-028-193 受付時間 9:00~17:30(土、日、祝日を除く)

製造販売元  エスエス製薬株式会社

〒103-8481
東京都中央区日本橋浜町2-12-4
<http://www.ssp.co.jp/>

■副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構 <http://www.pmda.go.jp/> ☎0120-149-931

効能・効果

肩こりに伴う肩の痛み、腰痛、筋肉痛、関節痛、腱鞘炎(手・手首の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、捻挫

用法・用量

表面のプラスチックフィルムをはがし、1日1回1~2枚を患部に貼付します。ただし、1回あたり2枚を超えて使用しないでください。なお、本成分を含む他の外用剤を併用しないでください。

＜用法・用量に関連する注意＞

- 用法・用量を厳守してください。
- 本剤は、痛みやはれ等の原因になっている病気を治療するのではなく、痛みやはれ等の症状のみを治療する薬剤なので、症状がある場合だけ使用してください。
- 皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1~2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。
- 1回あたり、24時間を超えて貼り続けしないでください。さらに、同じ患部に貼りかえる場合は、その貼付部に発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きていないことを確かめてから使用してください。
- 同じ部位に他の外用剤を併用しないでください。
- 汗をかいたり、患部がぬれている時は、よく拭き取ってから使用してください。

成分 膏体 100g(4,667cm²)中

ジクロフェナクナトリウム……………1.0g
添加物として、エステルガムHG、スチレン・イソプレン・スチレンブロック共重合体、流動パラフィン、ポリイソブチレン、N-メチル-2-ピロリドン、BHT、ℓ-メントール、その他3成分を含有します。

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- 品質保持のため、開封後は袋の口を折り返し、外気にふれないようにして保管してください。
- 使用期限をすぎたものは使用しないでください。



☆本品には添付文書はついていません。ケースの表示が代用しています。