

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

《複合胃腸薬》

胃酸過多、胸やけ、胃部不快感、食べ過ぎ、胃弱



第2類医薬品

制酸剤、健胃生薬、消化剤配合



ミロンMの特長

- 消化酵素ピロチアスターゼ1000とプロザイムが消化を助け、胃腸の負担を軽くします。
- 健胃生薬成分が食べ過ぎ、飲み過ぎなどで弱った胃を元気にしてくれます。
- 制酸剤が出すぎた胃酸を中和し、胸やけなどの不快な症状を和らげます。
- 銅クロロフィリンナトリウムとカンゾウ末が荒れた胃粘膜を修復・保護します。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください
胃腸鎮痛鎮痙薬
2. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください
(母乳に移行して乳児の脈が速くなることがあります。)



相談すること


1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 高齢者。
- (4) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (5) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (6) 次の症状のある人。

排尿困難

- (7) 次の診断を受けた人。

腎臓病、心臓病、緑内障



2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

- (2) 2 週間位服用しても症状がよくなる場合

3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください

口のかわき、便秘、下痢

その他の注意

母乳が出にくくなることがあります。

効能・効果

胃酸過多、胸やけ、胃部不快感、胃部・腹部膨満感、もたれ（胃もたれ）、胃重、胸つかえ、げっぷ（おくび）、はきけ（むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心）、嘔吐、食べ過ぎ（過食）、飲み過ぎ（過飲）、胃痛、食欲不振（食欲減退）、消化不良、胃弱、消化促進

用法・用量

次の1回量を、1日3回、食前または食後に服用してください。

年 齢	1 回服用量	1 日服用回数
大人（15 才以上）	1 包	3 回
11 才以上 15 才未満	2/3 包	
8 才以上 11 才未満	1/2 包	
8 才未満	服用しないでください	

＜用法・用量に関連する注意＞

- （1）定められた用法・用量を厳守してください。
- （2）小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

成分・分量

ミロンMは、大人1日量3包（1包：1200mg）中に次の成分を含んでいます。

	成 分	3 包中		成 分	3 包中
制 酸 剤	炭酸水素ナトリウム	1200mg	利 胆 剤	ウルソデオキシコール酸	20mg
	炭酸マグネシウム	500mg		ケイヒ末	320mg
	ロートエキス3倍散 （ロートエキス）	90mg 30mg)		ウコン末	100mg
粘膜修復剤	カンゾウ末	150mg		ウイキョウ末	80mg
	銅クロロフィリンナトリウム	45mg		ゲンチアナ末	60mg
消化酵素剤	ビオチン	60mg		ショウキョウ末	50mg
	プロザイム	20mg			


添加物として、乳糖、バレイショデンプン、ヒドロキシプロピルセルロース、カルメロースCa、D-マンニトール及びL-メントールを含有します。

＜成分に関連する注意＞

本剤の服用により便が緑色になることがありますが、配合されている銅クロロフィリンナトリウム（緑色）によるものであり、心配ありません。

保管及び取り扱い上の注意

- （1）直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- （2）小児の手の届かない所に保管してください。
- （3）他の容器に入れ替えないでください。
（誤用の原因になったり品質が変わることがあります。）
- （4）1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。
- （5）配置期限（ケースに記載）を過ぎた製品は、服用しないでください。



お問い合わせ先

第一薬品株式会社 お客様相談室
電話 076 (432) 2736 (代表)
受付時間：9時から17時まで（土、日、祝日を除く）



第一薬品株式会社
富山県富山市荒川一丁目4番26号