＊2012年10月改訂
（事務連絡に伴う改訂）

Kracie

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

第2類医薬品

漢方製剤

ベルアベトン

特　徴

●「ベルアベトン」は、漢方の古典といわれる中国の医書「金匱要略（キンキヨウリャク）」に収載されている「八味地黄丸」という薬方からなるお薬です。

●疲れやすくて手足が冷える方の頻尿、軽い尿漏れ、かすみ目などの症状に効果があります。

⚠使用上の注意

⊗してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります）

次の人は服用しないでください

（1）胃腸の弱い人
（2）下痢しやすい人

相談すること

1.次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

（1）医師の治療を受けている人
（2）妊婦又は妊娠していると思われる人
（3）のぼせが強く赤ら顔で体力の充実している人
（4）今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人

2.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症　　状
皮　　膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	食欲不振、胃部不快感、腹痛
そ の 他	動悸、のぼせ

＊3.服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

下痢

4.1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効　能

体力中等度以下で、疲れやすくて、四肢が冷えやすく、尿量減少又は多尿で、ときに口渇があるものの次の諸症：頻尿、夜間尿、軽い尿漏れ、排尿困難、残尿感、下肢痛、腰痛、しびれ、高齢者のかすみ目、かゆみ、むくみ、高血圧に伴う随伴症状の改善（肩こり、頭重、耳鳴り）

頻尿

軽い尿漏れ

用法・用量

次の量を 1日3回食前又は食間に水又は白湯にて服用。

年　齢	1回量	1日服用回数
成人（15才以上）	4錠	3回
15才未満	服用しないこと	

（裏面につづきます）

成　分

成人1日の服用量12錠(1錠305mg)中

ジオウ（熟ジオウ）末 ……890mg
サンシュユ末 ……445mg
サンヤク末 ……445mg
タクシャ末 ……334mg
ブクリョウ末 ……334mg
ボタンピ末 ……334mg
ケイヒ末 ……111mg
ブシ末 ……111mg

添加物として、ヒドロキシプロピルセルロース、ハチミツ、ポビドン、ステアリン酸Mg、ケイ酸Al、白糖を含有する。

〈成分に関連する注意〉

本剤は天然物（生薬）を用いていますので、錠剤の色が多少異なることがあります。

保管及び取扱い上の注意

(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
(2)小児の手の届かない所に保管してください。
(3)他の容器に入れ替えないでください。
（誤用の原因になったり品質が変わります。）
(4)ビンの中の詰物は、輸送中に錠剤が破損するのを防ぐためのものです。開栓後は不要となりますのですてください。
(5)使用期限のすぎた商品は服用しないでください。
(6)水分が錠剤につきますと、変色または色むらを生じることがありますので、誤って水滴を落としたり、ぬれた手で触れないでください。

健康アドバイス

●体を冷やさない

冷たいものをとりすぎるのは体を冷やすもとです。食事は、煮たり炒めたりして火を通したものを食べるようにし、就寝前の水分は控えましょう。

●体は適度に動かしましょう

新陳代謝を高めるために大切なのは、体を動かすことです。ただし、運動の目的はあくまでも健康維持です。体に無理のない、マイペースでできる運動をしましょう。

●食事はバランスよく

バランスのよい食事は、生活のリズムを保つために大切なこと。さまざまな栄養素をとるために、1日30種類の食品をとりましょう。

副作用被害救済制度の問合せ先
(独)医薬品医療機器総合機構
http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html
☎ 0120-149-931

本剤について、何かお気づきの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。
クラシエ 薬品株式会社　お客様相談窓口 ☎(03) 5446-3334
受付時間　10：00～17：00（土、日、祝日を除く）

ホームページ　www.kracie.co.jp

発　売　元　クラシエ 薬品株式会社
東京都港区海岸3-20-20（〒108-8080）

製造販売元　クラシエ 製薬株式会社
東京都港区海岸3-20-20（〒108-8080）

TS03