



2013年3月改訂

Kracie

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

第2類医薬品

漢方製剤

ベルアベトン

特 徴

- 「ベルアベトン」は、漢方の古典といわれる中国の医書「キンキヨウリヤク金匱要略」に収載されている「八味地黄丸」という薬方からなるお薬です。
- 疲れやすく手足が冷える方の頻尿、軽い尿漏れ、かすみ目などの症状に効果があります。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

次の人は服用しないでください

- (1) 胃腸の弱い人
- (2) 下痢しやすい人

🗨 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
- (3) のぼせが強く赤ら顔で体力の充実している人
- (4) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	食欲不振、胃部不快感、腹痛
そ の 他	動悸、のぼせ、口唇・舌のしびれ

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

下痢

4. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効 能

体力中等度以下で、疲れやすく、四肢が冷えやすく、尿量減少又は多尿で、ときに口渴があるものの次の諸症：頻尿、夜間尿、軽い尿漏れ、排尿困難、残尿感、下肢痛、腰痛、しびれ、高齢者のかすみ目、かゆみ、むくみ、高血圧に伴う随伴症状の改善（肩こり、頭重、耳鳴り）



頻尿



軽い尿漏れ

用法・用量

次の量を 1日3回食前又は食間に水又は白湯にて服用。

年 齢	1回量	1日服用回数
成人（15才以上）	4錠	3回
15才未満	服用しないこと	

成 分

成人1日の服用量12錠（1錠305mg）中、次の成分を含んでいます。

ジオウ（熟ジオウ）末890mg
サンシュユ末445mg
サンヤク末445mg
タクシャ末334mg
ブクリョウ末334mg
ボタンピ末334mg
ケイヒ末111mg
ブシ末111mg

添加物として、ヒドロキシプロピルセルロース、ハチミツ、ポビドン、ステアリン酸Mg、ケイ酸Al、白糖を含有する。

〈成分に関連する注意〉

本剤は天然物（生薬）を用いていますので、錠剤の色が多少異なることがあります。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) ビンの中の詰物は、輸送中に錠剤が破損するのを防ぐためのものです。開栓後は不要となりますので捨ててください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。
- (6) 水分が錠剤につきますと、変色または色むらを生じることがありますので、誤って水滴を落としたり、ぬれた手で触れないでください。



副作用被害救済制度の問合せ先
(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/>
☎ 0120-149-931

本剤について、何かお気づきの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

クラシエ薬品株式会社 お客様相談窓口 ☎ (03) 5446-3334
受付時間 10:00~17:00（土、日、祝日を除く）

ホームページ www.kracie.co.jp

発 売 元 **クラシエ薬品株式会社**
東京都港区海岸3-20-20（〒108-8080）

製造販売元 **クラシエ製薬株式会社**
東京都港区海岸3-20-20（〒108-8080）