

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

日本標準商品分類番号
87237

第2類医薬品

胃もたれ・飲み過ぎ・胃の痛み・胸やけに

蒼蔘散[®]AT ソウジンサン

高麗紅蔘・蒼朮配合胃腸薬

食生活やライフスタイルの多様化により、現代人の胃の疲れは、飲み過ぎ・食べ過ぎなどによる胃もたれ・むかつき・胃部不快感、ストレスなどによる胃の痛み・胸やけなど、胃腸の不快感の症状としてあらわれてきます。

蒼蔘散ATは、胃もたれ・飲み過ぎ・胃の痛み・胸やけなどの不快な胃腸症状に効果を発揮する胃腸薬です。スッとした清涼感と特異な芳香のある細粒です。携帯に便利な分包タイプで外出先でもお使いいただけます。

＜特長＞

- ・健胃生薬「高麗紅蔘」コウライコウジン「蒼朮」ソウジュツ「桂皮」ケイヒが、弱った胃腸の働きを活発にします。
- ・2つの制酸剤が出すぎた胃酸を中和して胃痛・胃酸過多などを改善します。
- ・粘膜修復剤の「延胡索」エンゴサクが荒れた胃粘膜を保護・修復して、不快な胃腸症状を改善します。



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください。

- (1)医師の治療を受けている人。
- (2)次の診断を受けた人。

腎臓病

2. 次の場合は、服用を中止し、この説明文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。

2週間位服用しても症状がよくならない場合。

3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください。

便秘、下痢

■効能・効果

もたれ(胃もたれ)、胃痛、胸やけ、げっぷ(おくび)、胃酸過多、胃部不快感、はきけ(悪心、嘔気、むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき)、飲み過ぎ(過飲)、食欲不振(食欲減退)、嘔吐、胃部・腹部膨満感、消化不良、食べ過ぎ(過食)、胸つかえ、胃弱、胃重

■用法・用量

次の1回量を1日3回、4時間以上服用間隔をおいて服用してください。

年 齢	1回量	1日服用回数
15歳以上	1包	3回
11歳以上15歳未満	2/3包	
8 歳以上11歳未満	1/2包	
8 歳未満	服用しないでください。	

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)定められた用法、用量を厳守してください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

成分・分量

	成分	1包(1.3g)中含量	はたらき
健胃剤	コウライコウジン 高麗紅参乾燥エキス	133.33mg (原生薬として800mg)	胃粘膜の血流を改善し、弱った胃腸の働きをよくします。
	ソウジュツ 蒼朮末(ソウジュツ末)	200mg	胃酸を分泌する神経に働きかけ胃酸分泌をコントロールします。
	ケイヒ 桂皮末(ケイヒ末)	200mg	特有の芳香が消化を促進し、食欲を増進させ、弱った胃腸の働きをよくします。
制酸剤	ボレイ 牡蠣末(ボレイ末)	400mg	胃酸を中和し、胃痛・胃酸過多・胃部不快感などに効果があります。
	水酸化マグネシウム	133.33mg	
粘膜修復剤	エンゴサク 延胡索乾燥エキス	66.67mg (原生薬として600mg)	胃酸の刺激を受けた胃の粘膜を修復することで、不快な胃腸症状の改善を助けます。

●添加物として、乳糖、D-マンニトール、ケイ酸Ca、ヒドロキシプロピルセルロース、オリブ油、アスパルテーム（L-フェニルアラニン化合物）、l-メントールを含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります。）
- (4)1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。
- (5)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

包装 8包、16包

〈製品情報問い合わせ先〉

明治製菓株式会社 くすり相談室：電話 (03)3273-3474
受付時間：9時から17時まで（土、日、祝日を除く）

〈副作用被害救済制度の問い合わせ先〉

（独）医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話 0120-149-931（フリーダイヤル）