

服用前に、この説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

第2類医薬品

疲れたあなたの胃痛、胃弱、胃酸過多に

痛みをブロック 蒼胡参クール

ソウコサン

販売名: 蒼胡参クール

疲れたあなたの胃の痛み



胃の健康は、胃酸分泌や胃粘膜細胞の生まれ変わりが適正にコントロールされることで保たれています。しかし、疲れがたまったり生活習慣の乱れでトラブル状態に陥るとこれらのバランスが崩れてしまうため、胃酸過多や胃粘膜が荒れた状態になり、胃痛などの症状が現れます。

蒼胡参クールは、疲れたあなたの胃痛、胃弱、胃酸過多に効きます。
ソウコサン



使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください。
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 次の診断を受けた人。
腎臓病
- 次の場合は、服用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師に相談してください。
2週間位服用しても症状がよくなりえない場合。
- 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください。
便秘、下痢

【効能・効果】

胃痛、胸やけ、げっぷ(おくび)、胃酸過多、胃部不快感、はきけ(悪心、嘔気、むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき)、もたれ(胃もたれ)、食欲不振(食欲減退)、嘔吐、胃部・腹部膨満感、消化不良、食べ過ぎ(過食)、飲み過ぎ(過飲)、胸つかえ、胃弱、胃重

【用法・用量】



次の1回量を1日3回、4時間以上服用間隔をおいて服用してください。

年 齢	1 回 量	1日服用回数
15 歳 以上	1 包	3 回
11歳以上15歳未満	2/3 包	
8歳以上11歳未満	1/2 包	
8 歳 未 満 は、服用しないでください。		

＜用法・用量に関連する注意＞

- 定められた用法・用量を厳守してください。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

【成分・分量】：1日量3包（3900mg）中

	成 分	1日量(3包)中含量	はたらき
健胃剤	ソウジュツ末 (蒼朮)	600mg	胃液の分泌を抑制し、 むかつき・胸やけなどに 効果を発揮します。 
	高麗紅参 乾燥エキス (コウジン 2400mg より得る)	400mg	胃粘膜の血流を改善し、 胃弱・胃もたれなどに 効果を発揮します。 
	ケイヒ末 (桂皮)	600mg	胃粘膜の血流を改善し、 胃粘膜を保護し、胃弱・ 胃もたれなどに効果を 発揮します。 
制酸剤	ボレイ末 (牡蠣殻)	1200mg	即効性の胃酸中和作用で 胃痛・胃酸過多・胃部 不快感などに効果を 発揮します。 
	水酸化 マグネシウム	400mg	即効性の胃酸中和作用で 胃痛・胃酸過多・胃部 不快感などに効果を 発揮します。 
粘膜修復剤	延胡索 乾燥エキス (エンゴサク 1800mg より得る)	200mg	胃液の分泌を抑制し、 胃粘膜の修復を促すこと で、胃腸の不快感を 改善します。 

●添加物として乳糖水和物、D-マンニトール、ケイ酸カルシウム、ヒドロキシプロピルセルロース、アスパルテーム(L-フェニルアラニン化合物)、L-メントール、オリーブ油を含有します。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

消費者相談窓口

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店あるいは下記にお願いいたします。

翠松堂製薬株式会社 お客様相談室 ☎0120-089961

受付時間：月～金 午前9時～午後5時まで(祝日は除く)

翠松堂製薬株式会社
三重県四日市市赤堀2-12-31