

*：2012年2月に改訂しました
(記載要領変更に伴う改訂)

この添付文書は、お薬とともに保管し、
ご使用の際には、必ずお読み下さい。

【化膿性皮膚疾患用薬】

黄色ワグラス[®]軟膏S 第2類医薬品

- ◆ とびひ(みずぶくれを伴うもの)・めんちょう(顔にできるおでき)・毛のう炎(皮膚の毛根あたりの炎症)といった化膿性の皮膚病は、ブドウ球菌などの細菌が皮膚に感染して起こります。黄色ワグラス軟膏Sは、このような皮膚病を改善するために考え出された外用の軟膏剤(塗り薬)です。
- ◆ 黄色ワグラス軟膏S中のスルファジアジンが原因菌を殺菌し、ジフェンヒドラミン塩酸塩・オウバク・ウコンは毛のう炎などの炎症を鎮め、化膿性皮膚疾患の回復を手助けするように働きます。

* 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (3) 患部が広範囲の人。
 - (4) 湿潤やただれのひどい人。
 - (5) 深い傷やひどいやけどの人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がある
ので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師
又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
ひ ふ 皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ

3. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
4. 他の医薬品等を併用する場合には、含有成分の重複に注意する必要がある
ので、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

効能・効果

化膿性皮膚疾患(とびひ、めんちょう、毛のう炎)

用法・用量

1日数回、適量を患部に塗布又は塗擦して下さい。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 用法・用量を厳守すること。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- (3) 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。
- (4) 外用にのみ使用すること。
- (5) 患部を清潔にしてから使用すること。
- (6) 薬が滲出液を吸い取るので、滲出液が多い場合はガーゼ等を当てていても衣服の汚れることがあります。そのような場合は、ガーゼ等を厚くして下さい。

成分・分量

本剤100g中

ウコン末……2.86g ジフェンヒドラミン塩酸塩……0.71g
オウバク末……1.43g スルファジアジン……5.00g

添加物としてクエン酸、マクロゴール400、マクロゴール4000を含有する。

・本剤は黄褐色で、特異なおいを有する軟膏剤です。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 本剤は寒冷時に多少固くなることがありますが、効果に変わりはありませんので温湯等で少し温め軟らかくしてからご使用下さい。
- (5) 有効成分ウコン・オウバクの黄色は染料にも使用される色素です。そのため、衣服やくつ下などに薬剤が付着すると色が落ちにくいので、ご注意下さい。

薬と養生

黄色ワグラス軟膏Sは生薬の特性を活かした生薬配合製剤ですので、あなたの体質や病状を考えて正しく使用することが大切です。

また、気持ちの持ち方(気の養生)や食生活(食の養生)に注意することも、病気を治すためには大事なことです。

あなたの病気を早く治すため、お薬の使用に際しては、生薬配合製剤や養生方法のことをご理解いただいている医師やホノミ漢方会々員の薬局・薬店の先生方とよくご相談下さい。

お問い合わせ先

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、又は下記をお願いします。

剂盛堂薬品株式会社 学術部

電話 073(472)3111(代表)

受付時間 9:00~12:00 13:00~17:00

(土、日、祝日を除く)

製造販売元



剂盛堂薬品株式会社

〒640-8323 和歌山市太田二丁目8番31号