

日本薬局方

カンゾウ末

販売名：高砂カンゾウ末

第3類医薬品

使用上の注意

【相談すること】

1. 次の人は、服用前に医師又は薬剤師に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - (3) 高齢者
 - (4) 次の症状のある人
 - ・むくみ
 - (5) 次の診断を受けた人
 - ・高血圧、心臓病、腎臓病
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この製品を持つて医師又は薬剤師に相談してください。
 - (1) まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症	尿量が減少する。 顔や手足がむくむ。 まぶたが重くなる。 手がこわばる。 血圧が高くなる。 頭痛等があらわれる。

- (2) 5～6回服用しても症状がよくならない場合

【他の注意】 短期間の服用にとどめ、連用は避けてください。

【効能又は効果】

激しい咳、咽喉痛の緩解

【用法及び用量】

成人(15歳以上)は1回量0.5g、1日2回、食前または食間に服用する。

高砂薬業株式会社

大阪市阿倍野区天王寺町南1-1-2

お客様相談窓口

☎ 072-977-7151

8000000000000

保管及び取扱い上の注意

1. 直射日光の当たらない温氣の少ない涼しい所に保管してください。
 2. 小児の手の届かない所に保管してください。
 3. 本品は天然品ですので、吸湿してカビ・虫害等の発生する恐れがあります。保管には充分ご注意ください。
 4. 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
 5. 開封後はお早めにご使用ください。また、開封口をしっかりと閉じて保管してください。
- ◎ 万一製品に異常がありましたら
弊社宛御連絡ください。



紙
ラベル



内袋

