

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

トピック鼻炎「カプセル」

第②類医薬品

鼻炎用内服薬

花粉や家庭などから出る埃によるアレルギー性の鼻症状やかぜのひき始め、季節の変わり目などによる鼻症状又は副鼻腔炎症状は、とても不快でつらいものです。トピック鼻炎「カプセル」は、これらの症状である：くしゃみ、鼻水（鼻汁過多）、鼻づまり、なみだ目、のどの痛み、頭重（頭が重い）の緩和に優れた効果をあらわす服用し易いカプセル剤です。

△使用上の注意

❌ してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります）

1. 次の人は服用しないでください

(1)本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。

(2)次の症状のある人。

前立腺肥大による排尿困難

(3)次の診断を受けた人。

高血圧、心臓病、甲状腺機能障害、糖尿病

2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください

他の鼻炎用内服薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬（かぜ薬、鎮咳去痰薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬）、フェニルプロパノールアミン塩酸塩を含有する内服薬（かぜ薬、鎮咳去痰薬）

3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください

（眠気があらわれることがあります。）

4. 長期連用しないでください

🗨️ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください

(1)医師の治療を受けている人。

(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。

(3)高齢者。

(4)本人又は家族がアレルギー体質の人。

(5)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

(6)次の症状のある人。

高熱、排尿困難

(7)次の診断を受けた人。

緑内障

(8)モノアミン酸化酵素阻害剤（セレギリン塩酸塩等）で治療を受けている人。

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください

(1)服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	悪心・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい、不眠、神経過敏
そ の 他	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック （アナフィラキシー）	服用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさがあらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 （スティーブンス・ ジョンソン症候群） 中毒性表皮壊死症 （ライエル症候群）	高熱を伴って、発疹・発赤、火傷様の水ぶくれ等の激しい症状が、全身の皮膚、口や目の粘膜にあらわれる。

裏面も必ずお読みください

(2) 5～6日間服用しても症状がよくならない場合

3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください
口のかわき

〔効能・効果〕

急性鼻炎、アレルギー性鼻炎又は副鼻腔炎による次の諸症状の緩和：くしゃみ、鼻みず（鼻汁過多）、鼻づまり、なみだ目、のどの痛み、頭重（頭が重い）

〔用法・用量〕


次の1回量を、食後に服用してください。

年 齢	1 回量	1 日服用回数
成人(15歳以上)	2 カプセル	3 回
7 歳以上 15 歳未満	1 カプセル	
7 歳未満の幼児	服用しないでください。	

〈用法・用量に関連する注意〉

1. 用法・用量を厳守してください。
2. 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
3. （カプセルの取り出し方）

右の図のようにカプセルの入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して裏面のアルミ箔を破り、取り出してお飲みください。（誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思われ事故につながります。）



〔成分と作用〕

1日量〔6カプセル(1カプセル：0.32g)〕中に次の成分を含有しています。

成 分	含 量	作 用
クロルフェニラミン マレイン酸塩	12mg	アレルギー症状（鼻水・くしゃみ）をおさえます。
ブノイドエフェドリン 塩酸塩	180mg	血管収縮作用により、鼻粘膜の充血をおさえます。
グリチリチン （グリチルリチン酸として）	45mg (24.3～37.1mg)	鼻粘膜のアレルギー反応をおさえ、炎症をやわらげます。
無水カフェイン	50mg	頭重をやわらげます。

添加物として、乳糖水和物、トウモロコシデンプン、結晶セルロース、マクロゴール6000、ヒドロキシプロピルセルロース、CMC-Ca、酸化チタン、ラウリル硫酸Na、亜硫酸水素Naを含有します。

〔保管及び取扱い上の注意〕

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
2. 小児の手の届かない所に保管してください。
3. 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わります。）
4. 使用期限（外箱に記載）を過ぎた製品は服用しないでください。

お問い合わせ先

日新薬品工業株式会社 お客様相談室

〒520-3426 滋賀県甲賀市甲賀町田堵野80-1

☎ 0120-415-688

受付時間 9:00～17:00（土、日、祝日を除く）

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

製造販売元

日新薬品工業株式会社

滋賀県甲賀市甲賀町田堵野80-1