

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

便秘に伴う諸症状をやわらげる

第2類医薬品  
便秘薬

# カイラックス

カイラックスはピサコジルを配合した便秘薬です。大腸に直接作用し、低下している腸のぜん動運動を高め、おだやかなお通じが期待できます。

## ⚠ 使用上の注意

### ❌ してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります）

1. **本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください**  
他の瀉下薬（下剤）
2. **大量に服用しないでください**



### 相談すること

1. **次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください**  
(1) 医師の治療を受けている人。  
(2) 妊婦または妊娠していると思われる人。  
(3) 次の症状のある人。  
はげしい腹痛、吐き気・嘔吐
  2. **服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください**
- | 関係部位 | 症 状           |
|------|---------------|
| 消化器  | はげしい腹痛、吐き気・嘔吐 |
3. **服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続または増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師または登録販売者に相談してください**  
下痢
  4. **1週間位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください**

## 【効能・効果】

- 便秘
- 便秘に伴う次の症状の緩和：頭重、のぼせ、肌あれ、吹出物、食欲不振（食欲減退）、腹部膨満、腸内異常醗酵、痔

## 【成分・分量】

1日量（3錠）中

ピサコジル……………15mg

添加物：乳糖水和物、トウモロコシデンプン、ヒドロキシプロピルセルロース、クロスポビドン、ステアリン酸マグネシウム、メタクリル酸コポリマーLD、ラウリル硫酸ナトリウム、ポリソルベート80、クエン酸トリエチル、タルク、白糖、アラビアゴム末、ゼラチン、沈降炭酸カルシウム、酸化チタン、マクロゴール6000、カルメロースナトリウム、カルナウバロウ、赤色3号を含有

## 【用法・用量】

次の1回量を就寝前に水またはお湯でかまずに服用してください。


ただし、初回は最小量を用い、便通の具合や状態をみながら少しずつ増量または減量してください。

年 齢	1回量	1日服用回数
成人（15歳以上）	2～3錠	1回
11歳以上15歳未満	1～2錠	
11歳未満の小児	服用しないこと	

### 〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 本剤は強い作用の便秘薬ですので服用には十分ご注意ください。
- (3) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (4) 本剤は腸溶錠ですので、錠剤をかんだり、割ったり、つぶしたりせずにそのまま服用してください。
- (5) なるべく空腹時に服用してください。
- (6) 制酸剤\*や牛乳をのんでから1時間以内は服用しないでください。  
※制酸剤：多くの胃薬に含まれている成分で、胃酸を中和する働きをもつ。
- (7) 錠剤の取り出し方

右図のように錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して裏面のアルミ箔を破り、取り出してお飲みください。（誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります。）



## 【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 誤用をさげ、品質を保持するために他の容器に入れかえないでください。

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

### お問い合わせ先

日新薬品工業株式会社 お客様相談室

〒520-3426 滋賀県甲賀市甲賀町田堵野80-1

☎ 0120-415-688

受付時間 9:00～17:00（土、日、祝日を除く）

製造販売元 **日新薬品工業株式会社**  
滋賀県甲賀市甲賀町田堵野80-1