

この説明文書は使用前に必ずお読み下さい。
また必要なとき読めるように保存しておいて下さい。

目の疲れ・充血に

眼科用薬

第3類医薬品

ボボンピュメリ目薬R

● シオノギ製薬

長時間にわたるパソコン作業などによりビジネスパーソンは目が疲労しがちです。
「ボボンピュメリ目薬R」は、ビタミンB12・B6を配合し、このような疲労による“目の疲れ”，“結膜充血”などの症状を緩和します。



使用上の注意……



相談すること

1. 次の人は使用前に医師または薬剤師にご相談下さい

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 本人または家族がアレルギー体質の人
- (3) 薬によりアレルギー症状をおこしたことがある人
- (4) 次の症状のある人
　　はげしい目の痛み
- (5) 次の診断を受けた人
　　緑内障

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師または薬剤師にご相談下さい

- (1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ

- (2) 目のかすみが改善されない場合
- (3) 2週間くらい使用しても症状がよくならない場合

……効能・効果……

目の疲れ、結膜充血、目のかすみ（目やにの多いときなど）、眼病予防（水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど）、紫外線その他の光線による眼炎（雪目など）、眼瞼炎（まぶたのただれ）、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感、目のかゆみ

……用法・用量……

1回2～3滴、1日5～6回点眼して下さい。

〈用法・用量に関する注意〉

- 定められた用法・用量を厳守して下さい。
- 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させて下さい。
- 容器の先をまぶた、まつ毛にふれさせないで下さい。
また、混濁したものは使用しないで下さい。
- ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないで下さい。
- 点眼用にのみ使用して下さい。



容器の先をまぶた、まつ毛に
ふれさせないようにしましょう

……成分・分量……

ポポンピュメリ目薬Rは、赤色の透明な点眼液で、100mL中に次の成分を含有しています。

成 分	含量(100mL中)	はたらき
シアノコバラミン(ビタミンB12)	5mg	目の調節機能に作用し、疲れをふせぐ
ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB6)	50mg	目の細胞の新陳代謝を活発にし、疲れをふせぐ
コンドロイチン硫酸ナトリウム	100mg	目の角膜の乾燥を防ぎ、潤いをあたえる
クロルフェニラミンマレイン酸塩	10mg	目の炎症やかゆみをおさえる
タウリン	100mg	目の細胞の新陳代謝を活発にし、疲れをふせぐ


添加物として ホウ酸、ホウ砂、濃ベンザルコニウム塩化物液 50、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油 60、l-メントール、d-ボルネオール、ハッカ油、ワイキョウ油を含有しています。

〈成分・分量に関する注意〉

本剤は赤色の点眼液ですが、こぼれてシャツなどに付着しても、水洗いすればしみは残りません。

……保管および取扱い上の注意……

- (1) 直射日光の当らない湿気の少ない、涼しい所に密栓して保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。
(誤用の原因になったり、品質が変化します)
- (4) 他の人と共用しないで下さい。
- (5) 車のダッシュボードなど高温下に放置しないで下さい。
(容器の変形や薬液の品質が劣化することがあります)
- (6) 保存の状態によっては、成分の結晶が容器の点眼口周囲やキャップの内側に白く付くことがあります。その場合には、清潔なガーゼで軽くふきとて使用して下さい。
- (7) 一度開封した後は、品質保持の点から、なるべく早めにご使用下さい。
- (8) 使用期限をすぎた製品は、使用しないで下さい。



……お問い合わせ先……

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記までお願いいたします。
塩野義製薬株式会社「医薬情報センター」

電話：大阪 06-6209-6948、東京 03-3406-8450

受付時間：9時～17時（土、日、祝日を除く）

「副作用被害救済制度」について

(独)医薬品医療機器総合機構 <http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>

電話 0120-149-931（フリーダイヤル）

……包 装……

ポポンピュメリ目薬 R : 15mL

®:登録商標

販売元

塩野義製薬株式会社

大阪市中央区道修町3丁目1番8号

製造販売元

テイカ製薬株式会社

富山市荒川一丁目3番27号